

# 殺虫剤

# オレート<sup>®</sup> 液剤

(オレイン酸ナトリウム液剤)

登録番号 第18249号



●有効成分 オレイン酸ナトリウム 20.0%

●性状 淡黄色澄明液体

●毒性 普通物

●有効年限 5 年

●危険物表示 第4類第二石油類(水溶性)

●包装 1ℓ×12本／ケース 5ℓ×4本／ケース

## [特長]

- 害虫に対する作用機作は、気門封鎖による窒息死です。
- うどんこ病に対する作用機作は、細胞膜破壊によるものです。
- 有効成分であるオレイン酸ナトリウムは、食品添加物に指定されている成分です。
- 収穫前日まで使用できます。
- 環境や天敵、ミツバチ等有用生物に対する影響が少ない殺虫剤です。

## [適用病害虫と使用方法]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	オレイン酸 ナトリウムを含 む農薬の 総使用回数
なし	アブラムシ類	100～200	200～700ℓ ／10a	発生初期～ 収穫前日まで	-	散布	-
果樹類 (なしを除く)		100					
野菜類 (いちごを除く)	コナジラミ類	100～300	100～300ℓ ／10a	発病初期～ 収穫前日まで	-	散布	-
	アブラムシ類	100					
いちご	コナジラミ類	100～300	100～300ℓ ／10a	発病初期～ 収穫前日まで	-	散布	-
	アブラムシ類	100					
	うどんこ病	100					
きくばら	アブラムシ類			発生初期～ 収穫前日まで			

## [上手な使い方]

- 害虫に薬液がムラなくかかるよう、ていねいに散布してください。

## [使用上の注意]

1. 本葉6～7枚期までの散布は薬害での恐れがあるので避けてください。
2. 高温時の散布は薬害の生じる恐れがあるので避けてください。
3. 敷布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見極めてから散布してください。
4. アルカリ性剤のため、他の薬剤との混用または近接散布には注意してください。
5. 病害虫の発生が多い場合は効果が十分に発揮されないこともあるので、5日前後の間隔で連続散布してください。
6. 薬害の恐れがあるので、周辺作物にかかるないように注意してください。
7. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
8. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
9. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。  
使用後は洗眼してください。

## [貯蔵上の注意]

1. 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。
2. 低温期には凝固することがありますが、融解後の成分に影響はありません。