

平成 28 年 10 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「OAT 石灰硫黄合剤」適用内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、殺虫殺菌剤「OAT 石灰硫黄合剤」が平成 28 年 10 月 5 日付けにて適用内容が変更されましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : OAT 石灰硫黄合剤 (第 2 3 6 4 1 号)

有効成分・% : 多硫化カルシウム 27.5%

登録年月日 : 平成 28 年 10 月 5 日 (適用内容の変更)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「みかん」、適用病害虫名「ヤノネカイガラムシ」の希釈倍数「60～80倍（硫酸亜鉛加用）」を「60～80倍」に変更（「硫酸亜鉛加用」の記載を削除）

理由：硫酸亜鉛は既に失効していますが、硫酸亜鉛を加用しなくてもヤノネカイガラムシに対する効果が認められるため、「硫酸亜鉛加用」の記載を削除しました。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	石灰硫黄合剤を含む農薬の総使用回数
果樹類	ハダニ類 サビダニ類	80～200 倍	夏期	—	散布	—
		20～40 倍	冬期			
落葉果樹	カイガラムシ類 ハダニ類 越冬病害虫	7～10 倍	発芽前			
りんご	腐らん病	10 倍	休眠期			
	うどんこ病 モニリア病	40～140 倍	—			
	モニリア病	60～140 倍	開花期			
なし	黒星病	7 倍	発芽前			
もも	縮葉病 胴枯病 黒星病					
うめ	縮葉病	8 倍				
すもも あんず	ふくろみ病	140 倍	—			
すぐり	うどんこ病	80～140 倍				
くり	芽枯病	20～40 倍	発芽前			
かき	黒星病 うどんこ病	100 倍	—			
みかん	カイガラムシ類 ハダニ類	20～40 倍	冬期			
	ハダニ類 そうか病 黒点病 かいよう病	80～200 倍	夏期			
	ヤノネカイガラムシ	60～80 倍	5～6 月			
麦類	赤かび病	100 倍	—			
	さび病 うどんこ病	40～140 倍				
茶	ハダニ類 サビダニ類	80～200 倍	夏期			
		20～40 倍	冬期			
びやくしん	赤星病	40 倍	—			
まつ	ハダニ類	20 倍	新梢発生前			
桑	カイガラムシ類 胴枯病	7～10 倍	—			
たばこ	うどんこ病	100～120 倍				

作物名	使用目的	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	石灰硫黄合剤を含む農薬の総使用回数
りんご	摘花	100～120 倍	満開後	2 回	立木全面散布	—

〈2〉注意事項等の変更

なし