

平成 30 年 2 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「トモノールS」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「トモノールS」が平成 30 年 2 月 14 日付にて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : トモノールS (第 9 7 8 3 号)
有効成分・% : マシン油 97.0%

登録年月日 : 平成 30 年 2 月 14 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ かき/カイガラムシ類の希釈倍数を「25~50倍」に変更。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マシン油を含む農薬の総使用回数
かんきつ	カイガラムシ類 ハダニ類	60～80倍	200～ 700L/10a	12～3月	—	散布	—
	ハダニ類	100～200倍		4～5月			
	ヤノネカイガラムシ幼虫 ハダニ類			夏期			
りんご	ハダニ類	25倍		発芽前			
		50倍		芽出直前直後			
		100倍		展葉期（発芽後 2週間まで）			
		200倍		展葉期（発芽後 3週間まで）			
なし	カイガラムシ類 ハダニ類	25～50倍		発芽前			
もも ネクタリン かき	カイガラムシ類	100倍		発芽後 2週間まで			
おうとう							
うめ							
すもも							
小粒核果類 （うめ、すももを 除く）							
キウイフルーツ							
びわ							
きゅうり			うどんこ病 ハダニ類		200倍	—	
いちご すいか なす			ハダニ類		100～150倍		
茶			クワシロカイガラムシ		50～100倍		1000L/10a
	100～150倍	1000L/10a		10～3月			
	チャトゲコナジラミ	50～100倍	200～ 400L/10a	5～9月			
		100～150倍		10～3月			
	カンザワハダニ チャノナガサビダニ	100～150倍	200～ 400L/10a	5～9月			
		50～150倍	400L/10a	10～3月			
桑	クワシロカイガラムシ	30倍	50～ 200L/10a	12～3月			
	クワシロカイガラムシ 若齢幼虫	50～60倍		5～11月			

適用農薬名	作物名	使用方法
ベノミル剤	なし	本剤でベノミル剤を20倍に希釈し、塗布する