

殺菌剤 登録番号 第23594号

# ショウチノスケ フロアブル

(フルチアニル・メパニピリム水和剤)



有効成分	フルチアニル 1.8% メパニピリム 20.0%
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性	普通物
有効年限	4年
包装 (1ケース)	250ml × 20本

## 特長

- 新規有効成分フルチアニルとメパニピリムとの混合剤です。
- Wの効果で既存剤に対して感受性が低下したうどんこ病に対しても高い効果を示し耐性菌発達のリスクを抑えます。
- 各種うどんこ病に安定した効果を示すほか、灰色かび病などと同時防除が可能です。
- 残効性に優れることから、1シーズン中のうどんこ病防除回数の低減が期待できます。
- 有用昆虫や天敵に対する影響が少なく、IPM(総合的病害虫管理)に有用な資材として使用できます。

## 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルチアニルを含む農薬の総使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
メロン すいか ピーマン	うどんこ病	2000	100~300 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内
かぼちゃ		32	1.6 ℓ/10a			無人航空機による散布		
きゅうり なす トマト ミニトマト	うどんこ病 灰色かび病	2000	100~300 ℓ/10a			散布		
いちご				3回以内				
花き類・ 観葉植物	うどんこ病			発病前~ 発病初期			5回以内	
樹木類			200~700 ℓ/10a					

## 使用上の注意

---

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
3. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
4. 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
  - ① 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施してください。
  - ② 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
5. 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
6. 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特にはじめに使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
7. 誤飲などのないよう注意してください。
8. 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
9. 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
10. 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

## 貯蔵上の注意

---

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。