

コック付きで穂肥の施用量を自由自在に！ まるとく液肥シリーズ

亜りん酸

速効性窒素

アミノ酸

糖

2種類のまるとく液肥 から
目的・成分・時期に合わせて選べる！

10-3-4

まるとく液肥和み[®]



生第105485号

0-9-5

まるとく液肥実り[®]



生第105482号

高温期のエネルギー補給で収量増！

亜りん酸

速効性窒素


アミノ酸

PKの力で倒伏軽減・高品質を確保！

亜りん酸

糖

水稻へのおすすめの施用時期



温暖化で肥切れを
実感している方に！

まるとく液肥和み[®]

※中干し2回目以降から出穂20日前まで

まるとく液肥実り[®]

※出穂20日前から出穂期まで

追肥したいけど、
倒伏が心配な方に！


その悩みは、**コック付き製品だから解決できる！**



様々な **流入条件・速度・時間** にも
簡単調節・均一施用できる！

使用方法

1. 土壌が隠れる程度入水する。
2. コックを取り付ける。
3. 箱を逆さまにする。
4. 水口で適切な量を流入させる。




注意事項

流量の調節について
製品からの流量はコックで
調節ください。



製品の設置について
製品が飛ばされないように
重しを乗せることを
お勧めします。



- ・製品を逆さにすると全量放出可能です。
- ・水口の枠がある場合は、枠の中に流入して下さい。枠がない場合は、水の流心付
- ・もし入水後に液肥が残った場合は、施用



OAT アグリオ株式会社

まるとく液肥和み、まるとく液肥実りはOATアグリオ株式会社の登録商標です。

まるとく液肥 [20kg入り] シリーズ

WEB



「まるとく液肥 和み」と「まるとく液肥 実り」の使い分けと成分のチカラ



ダブルの窒素で肥効が速い!

まるとく液肥 和み

窒素型

+

亜りん酸

根を充実させる

速効性窒素

アンモニア性窒素と硝酸性窒素のチカラ

アミノ酸

緩効性の窒素



高品質のお米を!

まるとく液肥 実り

りん酸カリ型

+

亜りん酸



根を充実させる

糖

根にエネルギーを与える

試験事例

\\ うるち米 も まるとく液肥 を与えて 好成績 //



試験内容

- 作物 試験地
- 出穂日 施用日
- 施用量 まるとく液肥 和み 10kg/10a+まるとく液肥 実り 20kg/10a [慣行:追肥なし]



収量 精玄米重(肩米を除いた玄米重、含水率は15%換算)
整粒率 被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒の割合

処理区別の比較

試験区名	倒伏程度 (0~5)	千粒重 (g)	食味値 (点)
まるとく液肥 和み+実り	0	21.0	75
慣行	2	19.6	77

※1 倒伏程度:6段階に区別した倒伏程度別の面積比率で表す。
0:無倒伏~5:完全倒伏
※2 千粒重:500粒重×3回の平均値から算出。
※3 食味値:米の食味評価値で、数値が高いほどおいしい。
85以上:極上 80~84:良 75~79:やや良 70~74:普通 65~69:やや劣る 65以下:劣る

\\ 酒米 も まるとく液肥 を与えて 好成績 //



試験内容

- 作物 試験地
- 出穂日 施用日
- 施用量 まるとく液肥 実り 10kg/10a [市販液肥:10.6kg/10a (P施用量を統一)]

収量 精玄米重(肩米を除いた玄米重、含水率は15%換算)
心白率 心白率(心白発現率、粒数比%)=心白整粒粒数÷整粒粒数×100

処理区別の比較

試験区名	倒伏程度 (0~5)	千粒重 (g)	整粒率 (%)
まるとく液肥 実り	0	25.9	70.9
市販液肥	0	25.4	68.2

※1 倒伏程度:6段階に区別した倒伏程度別の面積比率で表す。
0:無倒伏~5:完全倒伏
※2 千粒重:500粒重×3回の平均値から算出。
※3 整粒率:被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒の割合。

まるとく液肥 和み・まるとく液肥 実りは、野菜類・果樹類及び花き類にも使用できます!

土壌灌注:10aあたり5~10kgを200倍以上に希釈して施用してください。葉面散布:1000~2000倍に希釈して1~2週間に1回を目安に施用してください。

△ 使用上・保管上の注意

1. アルカリ性資材とは混用しないでください。
2. 肥料以外の用途には使用しないでください。
3. 幼児等の手の届かない場所に保管してください。
4. 容器の口を密封し冷暗所で保管してください。
5. 使用後は洗眼やうがいをし、皮ふに付着した場合は洗い流してください。
6. 眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

7. 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
8. 静置すると有機成分由来の沈殿が発生することがありますので、よく振って内容物を均一にしてからご使用ください。
9. 他の肥料との混用は、沈殿や結晶が発生しない場合のみご使用ください。
10. 希釈液は腐敗しやすいため、その日のうちに使いきってください。
11. 高温期における日中の葉面散布での使用はさけてください。
12. 氷点下になると結晶が発生したり、高温になる場所(温室など)では沈殿が発生するおそれがありますので、直射日光をさけ、室内の冷暗所で保管してください。

取り扱い



OAT アグリオ株式会社

<https://www.oat-agrio.co.jp/>

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: 050-1724-6881 (9:00~12:00, 13:00~17:00)
土・日・祝日をのぞく

2603GFG