

平成 28 年 11 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「デュアルサイド水和剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫殺菌剤「デュアルサイド水和剤」が平成 28 年 11 月 30 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : デュアルサイド水和剤 (第 23163 号)
有効成分・% : プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル 40.0%
ポリオキシシン複合体 18.0%
(ポリオキシシン B として 180,000AmBu/g)

登録年月日 : 平成 28 年 11 月 30 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ すいか、きゅうり、なすに「うどんこ病」を追加
- ・ トマトに「葉かび病」を追加
- ・ かき (灰色かび病) を追加

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	プロピレングリコー ルモノ脂肪酸エス テルを含む農薬 の総使用回数	ホリオキシンを含む農 薬の総使用回数
りんご	褐斑病 斑点落葉病 ハダニ類	2000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	-	5 回以内(散布は 3 回以内)
なし	ハダニ類 チャノキイロアザミウマ			収穫 7 日前 まで	5 回以内			5 回以内(イミノク タジン酢酸塩・ホリオキ シン水和剤は 3 回 以内)
ぶどう	灰色かび病 チャノキイロアザミウマ ハダニ類			収穫 60 日前 まで				5 回以内
かき	灰色かび病			収穫 30 日前 まで	3 回以内			3 回以内
すいか	ハダニ類 アザミウマ類 うどんこ病	100～300 L/10a	100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	5 回以内			5 回以内
メロン	ハダニ類 アザミウマ類			収穫前日 まで				5 回以内(塗布は 1 回以内)
きゅうり	ハダニ類 アザミウマ類				2 回以内			2 回以内
なす	うどんこ病							
いちご	ハダニ類			収穫開始 14 日前まで	3 回以内			3 回以内
トマト	トマトサビダニ アザミウマ類 葉かび病			収穫前日 まで	3 回以内	3 回以内		

<2>注意事項等の変更

なし