

平成 29 年 3 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「ベリマーク S C」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ベリマーク S C」が平成 29 年 3 月 22 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ベリマーク S C (第 2 3 5 5 6 号)

有効成分・% : シアントラニリプロール 18.7%

登録年月日 : 平成 29 年 3 月 22 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

作物名の追加

- ・ ミニトマト

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数				
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ウリハエ類	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペー パーポット1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5～4L) 当り 0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)				
はくさい	アブラムシ類 コナジラミ類 アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ										
ブロッコリー	コナジラミ類 アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類										
レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ										
非結球 レタス	アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバエ										
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 アザミウマ類	400 倍	1 株当り 25mL	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)				
きゅうり ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	800 倍	1 株当り 50mL								
		400 倍	1 株当り 25mL								
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ネキリムシ類 ハモグリバエ類	800 倍	1 株当り 50mL								
		400 倍	1 株当り 25mL								
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	800 倍	1 株当り 50mL								
		400 倍	1 株当り 25mL								
ねぎ	シロイモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペー パーポット1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5～4L) 当り 0.5L					育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時まで の処理は 1 回 以内、定植後 の散布は 3 回 以内)
		2000 倍	0.5L/m ²					収穫 7 日前ま で			

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	アオムシ コガ ハスモンヨトウ	400 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット1 冊 (約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5～4L) 当り 0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	1 回

<2>注意事項等の変更

なし