

平成 29 年 10 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「ハチハチ乳剤」登録内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が平成 29 年 10 月 25 日付けにて変更登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第 2 0 8 1 8 号)  
有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%

登録年月日 : 平成 29 年 10 月 25 日

<1>適用内容の変更：

- ・ トマト、ミニトマト、非結球レタス、なすへの作物の適用が削除。
- ・ レタスの使用時期が「収穫 3 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更。
- ・ ブロッコリーの使用時期が「収穫 3 日前まで」から「収穫 7 日前まで」に変更。
- ・ だいこんの使用時期が「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、本剤の使用回数が「2 回以内」から「1 回」に、適用病害虫名「白さび病」、「ワッカ症」が削除され、「アオムシ」、「コナガ」、「アブラムシ類」、「キスジノミハムシ」、「ハイマダラノメイガ」、「ナモグリバエ」、「カブラハバチ」の希釈倍数が「1000～2000 倍」から「2000 倍」に変更。
- ・ かぶの本剤の使用回数が「2 回以内」から「1 回」に、適用病害虫名「カブラハバチ」、「白さび病」が削除され、「キスジノミハムシ」「コナガ」の希釈倍数が「1000～2000 倍」から「2000 倍」に変更。
- ・ ねぎの使用時期が「収穫 3 日前まで」から「収穫 7 日前まで」に変更。
- ・ 「ピーマン」の本剤の使用回数が「2 回以内」から「1 回」に変更。

<2>注意事項等の変更

使用上の注意事項

【変更前】

(4) はくさい、なす、トマト、きゅうり、かぶ、にがうり、レタス・非結球レタスの幼苗期に使用すると薬害を生じる恐れがあるので使用をさけること。

【変更後】

(4) はくさい、きゅうり、かぶ、にがうり、レタスの幼苗期に使用すると薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェン <sup>®</sup> ラト <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類	1000倍	100 ~ 300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ	1000~2000倍					
	アオムシ アブラムシ類						
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000倍					
	ナメクジ類 べと病						
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ	2000倍		収穫30日前まで	1回		1回
かぶ	キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで			
きゅうり	ウリノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000~2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000倍					
にがうり	アザミウマ類						
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000倍					
	コナジラミ類 うどんこ病	1000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000倍					
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ アブラムシ類 さび病 べと病	1000倍		収穫7日前まで			
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000~2000倍					
ピーマン	アザミウマ類		収穫前日まで	1回	1回		
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病						
にんにく	ネギコガ アザミウマ類 アブラムシ類 チューリップサビダニ	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
にら	ネギアザミウマ		収穫14日前まで	1回	1回		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200 ～ 400 L/10a	摘採 14 日 前まで	1 回	散布	1 回
	チャトゲコナジラミ マダラカサハラハムシ ツマグロアオカスミカメ	1000倍					
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000倍	100 ～ 300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
	白さび病			発病初期			