

平成 29 年 10 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」登録内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が平成 29 年 10 月 25 日付けにて変更登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第 2 1 0 5 6 号)
有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%

登録年月日 : 平成 29 年 10 月 25 日

<1>適用内容の変更：

- ・ トマト、ミニトマト、なすへの作物の適用が削除。
- ・ なしの使用時期が「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に、適用病害虫名「シンクイムシ類」を削除し、適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」の希釈倍数が「1000～2000倍」から「2000倍」に、使用回数が「2回以内」から「1回」に変更。
- ・ すももの使用時期が「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更。
- ・ レタスの使用時期が「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」に変更。
- ・ 非結球レタスの希釈倍数「1000倍」が削除され、希釈倍数「1000～2000倍」が「2000倍」に変更され、使用回数が「2回以内」から「1回」に変更。
- ・ セルリーの使用時期が「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更。
- ・ いちごの使用時期が「収穫前日まで」から「1番花の開花まで」に、使用回数が「2回以内」から「1回」に変更。

<2>注意事項等の変更

使用上の注意事項

【変更前】

- (6) レタス・非結球レタス、なす、トマト、ミニトマト、はくさい及びセルリーの幼苗期には薬害を生じる恐れがあるので使用を避けること。

【変更後】

- (6) レタス・非結球レタス、はくさい及びセルリーの幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	
なし	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 クワコナカイガラムシ	2000倍	200～700 L/10a	収穫30日 前まで	1回	散布	1回	
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～ 3000倍		1000倍	収穫前日 まで		2回以内	2回以内
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000倍						
	アザミウマ類	1000～ 2000倍						
すもも	アブラムシ類	2000倍	1000～ 2000倍	収穫14日 前まで	2回以内	2回以内		
もも ネクタリン	シンクイムシ類	2000倍	1000倍	収穫前日 まで				
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ アザミウマ類	1000倍						
	アザミウマ類	1000倍						
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～ 2000倍	100～300 L/10a	収穫14日 前まで	1回	1回		
	うどんこ病	1000～ 2000倍						
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類	1000倍	1000～ 2000倍	収穫14日 前まで	1回	1回		
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ	1000～ 2000倍						
はくさい	アブラムシ類	1000～ 2000倍	1000倍	収穫14日 前まで	1回	1回		
	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000倍						
レタス	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類	1000倍	2000倍	収穫30日 前まで	2回以内	2回以内		
	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍						
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍	1000～ 2000倍	収穫30日 前まで	2回以内	2回以内		
セルリー	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍	1000～ 2000倍	収穫30日 前まで	2回以内	2回以内		

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
いちご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ うどんこ病	1000倍	100～300 L/10a	1番花の 開花まで	1回	散布	1回
すいか	アザミウマ類 うどんこ病	1000～ 2000倍		100～800 L/10a	収穫前日 まで		2回以内
	アブラムシ類						
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ	1000倍	100～800 L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～ 1500倍	200～400 L/10a	摘採14日 前まで	1回		1回
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ						
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
チューリップ	アブラムシ類	1000～ 2000倍	300L/10a		3回以内		
		チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～ 植付前	1回	15分 間球 根浸 漬