

平成 29 年 11 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が平成 29 年 11 月 8 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第 2 0 8 1 8 号)
有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 平成 29 年 11 月 8 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ はくさい/ナメクジ類 (1000倍) の追加。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト®を含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類	1000倍	100 ~ 300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類	1000~2000倍					
	ナメクジ類	1000倍					
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000~2000倍					
	ナメクジ類 べと病	1000倍					
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ	2000倍		収穫30日前まで	1回		1回
かぶ	キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで			
きゅうり	ウリノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000~2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000倍					
にがうり	アザミウマ類						
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000倍					
	コナジラミ類 うどんこ病	1000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000倍					
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ アブラムシ類 さび病 べと病	1000倍	収穫7日前まで				
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000~2000倍					
ピーマン	アザミウマ類		収穫前日まで	1回	1回		
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病						
にんにく	ネギコガ アザミウマ類 アブラムシ類 チューリップサビダニ	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
にら	ネギアザミウマ	1000倍	100 ~ 300 L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコマイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000~1500倍	200 ~ 400 L/10a	摘採14日前まで	1回		
	チャトゲコナジラミ マダラカサハラムシ ツマグロアオカスミカメ	1000倍					
さく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000倍	100 ~ 300 L/10a	発生初期	4回以内	4回以内	
	白さび病			発病初期			