

平成 29 年 11 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ベリマークSC」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ベリマークSC」が平成 29 年 11 月 8 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ベリマークSC (第23556号)

有効成分・% : シアントラニリプロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18.7%

登録年月日 : 平成 29 年 11 月 8 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 「いちご」及び「ほうれんそう」を追加。
- ・ 「なす」の「コナジラミ類」の希釈水量「400株当り10L(1株当り25mL)」を「400株当り10～20L(1株当り25～50mL)」に変更。
- ・ 「きゅうり」に「ハモグリバエ類」を追加。

<2>注意事項等の変更

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

【追加】

- (1) 水産動植物 (甲殻類) に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ウバ類	400 倍	セル成型育苗ト レイ1箱または ペーパーポット1 冊 (約30× 60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの処理は1 回以内、定植後の散布 は3回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類						
レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ						
非結球 レタス	アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバエ						
カリフラワー	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	2000 倍	0.5L/m ²	収穫7日 前まで	1 回	株元 灌注	4 回以内 (定植時までの処理は1 回以内、定植後の処理 は3回以内)
ねぎ	シロイモシヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類						
いちご	ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000 倍	50mL/株	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (灌注は1回以内、散布 は3回以内)
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロヒメノメイガ	4000 倍	0.2L/m ²	収穫7日 前まで	1 回	株元 灌注	1 回

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリハエ類	400株当たり 25mL	400株当たり 10～20L (1株当たり 25～50mL)	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)
きゅうり	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリハエ類						
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリハエ類 ネキリムシ類						
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						1回