

平成 29 年 10 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「オーシャインフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「オーシャインフロアブル」が平成 29 年 11 月 8 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オーシャインフロアブル (第 2 2 6 2 7 号)  
有効成分・% : オキシポコナゾールフマル酸塩 ..... 20.0%

登録年月日 : 平成 29 年 11 月 8 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 「うめ」の「黒星病」の希釈倍数を「2000～3000倍」に変更。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	オキホ <sup>®</sup> コナゾー ル <sup>®</sup> マル酸塩を 含む農薬の 総使用回数
りんご	赤星病 黒星病 モニリア病 うどんこ病	3000倍	200～ 700 L/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
おうとう	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病			収穫前日 まで			
小粒核果類 (うめを除く)	灰星病						
うめ	黒星病	2000～3000倍		収穫前日 まで	3回以内		3回以内
	すす斑病	2000倍					
	灰星病	3000倍					
もも ネクタリン	灰星病 黒星病	2000～3000倍		収穫7日前 まで	2回以内		2回以内
	ホモプシス腐 敗病	2000倍					
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病		2000倍	収穫前日 まで	5回以内	5回以内	
なし	赤星病 黒星病	3000倍	収穫前日 まで	5回以内	5回以内		