

平成 30 年 2 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「デュアルサイド水和剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫殺菌剤「デュアルサイド水和剤」が平成 30 年 2 月 14 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : デュアルサイド水和剤 (第 2 3 1 6 3 号)  
有効成分・% : プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル ..... 40.0%  
ポリオキシシン複合体 ..... 18.0%

登録年月日 : 平成 30 年 2 月 14 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 「なし」に「うどんこ病」を追加
- ・ 「かき」に「アザミウマ類」を追加

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	プロピレングリコー ルモノ脂肪酸エステ ルを含む農薬 の総使用回数	ポリオキシンを含む農 薬の総使用回数
りんご	褐斑病 斑点落葉病 ハダニ類	2000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	-	5 回以内(散布は 3 回以内)
なし	うどんこ病 ハダニ類 チャノキイロアザミウ マ			収穫 7 日前 まで	5 回以内			5 回以内(イノク タジ酢酸塩・ポリオキ シ水と和剤は 3 回以 内)
ぶどう	灰色かび病 チャノキイロアザミウ マ ハダニ類			収穫 60 日前 まで				5 回以内
かき	灰色かび病 アザミウマ類			収穫 30 日前 まで	3 回以内			3 回以内
すいか	うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類		100～300 L/10a	収穫 3 日前 まで	5 回以内			5 回以内
メロン	ハダニ類 アザミウマ類			収穫前日 まで				2 回以内
きゅうり	うどんこ病 ハダニ類 アザミウマ類				3 回以内			
なす	葉かび病 トマトサビダニ アザミウマ類							3 回以内
トマト	葉かび病 トマトサビダニ アザミウマ類				収穫開始 14 日前まで			
いちご	ハダニ類							