

平成 30 年 2 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が平成 30 年 2 月 14 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第 2 1 0 5 6 号)  
有効成分・% : トルフェンピラド ..... 15.0%

登録年月日 : 平成 30 年 2 月 14 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「なし(苗木)」の追加 (アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、2000倍、育苗期、2回以内)
- ・ 「はくさい」にナメクジ類 (1000倍) を追加
- ・ 「アスパラガス」にツマグロアオカスミカメ (1000倍) を追加

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数		
なし	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 クワコナカイガラムシ	2000倍	200～700 L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	1回		
なし(苗木)	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類	2000倍	100～700 L/10a	育苗期	2回以内		2回以内		
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで					
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000倍							
	アザミウマ類	1000～2000倍							
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫	1000倍							
すもも	アブラムシ類	2000倍	200～700 L/10a	収穫14日前まで				2回以内	2回以内
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで					
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ	2000倍							
	アザミウマ類	1000倍							
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで					
	うどんこ病	1000倍							
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類		1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで				
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ ナメクジ類								
はくさい	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000倍					
	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類						
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍			1回		1回
セルリー	アブラムシ類 ナモグリバエ				収穫30日前まで		2回以内
いちご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ うどんこ病	1000倍	100～ 300 L/10a	1番花の 開花まで	1回	散布	1回
すいか	アザミウマ類 うどんこ病			1000～ 2000倍			収穫前日 まで
	アブラムシ類						
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ ツマグロアオカスミカメ	1000倍	100～ 800 L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～ 1500倍	200～ 400 L/10a	摘採14日 前まで	1回		1回
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ	1000倍					
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
チューリップ	アブラムシ類	1000～ 2000倍	300L/10a		3回以内		
		チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～ 植付前	1回	15分 間球 根浸 漬