

平成 30 年 7 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が平成 30 年 7 月 25 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第 2 0 8 1 8 号)
有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 平成 30 年 7 月 25 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- ・ にんにく/さび病 (1000倍) の追加。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト [®] を含む農薬の総使用回数			
キャベツ	アザミウマ類	1000倍	100 ~ 300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内			
	ハイマダラノメイガ コナガ	1000~2000倍								
はくさい	アオムシ アブラムシ類	1000倍								
	ナメクジ類	1000倍								
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000~2000倍								
	ナメクジ類 べと病	1000倍								
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ	2000倍						収穫30日前まで	1回	1回
	かぶ							キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類		
きゅうり	ウリノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000~2000倍						収穫前日まで	2回以内	2回以内
	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000倍								
にがうり	アザミウマ類									
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000倍								
	コナジラミ類 うどんこ病	1000倍								
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000倍								
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ アブラムシ類 さび病 べと病	1000倍	収穫7日前まで							
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000~2000倍								
ピーマン	アザミウマ類	1000倍	収穫前日まで	1回	1回					
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病									
にんにく	ネギコガ アザミウマ類 アブラムシ類 チューリップサビダニ さび病	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
にら	ネギアザミウマ	1000倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 14 日前 まで	1回	散布	1回
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200 ～ 400 L/10a	摘採 14 日 前まで	1回		
	チャトゲコナジラミ マダラカサハラハムシ ツマグロアオカスミカメ	1000倍					
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類		1000倍	100 ～ 300 L/10a	発生初期		4回以内
	白さび病	発病初期					