

平成 30 年 12 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

## 「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が平成 30 年 12 月 5 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第 2 1 0 5 6 号)  
有効成分・% : トルフェンピラド ..... 15.0%

登録年月日 : 平成 30 年 12 月 5 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 適用病害虫名の追加 : いちご/クロバネキノコバエ類 (1000倍)

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 クワコナカイガラムシ	2000倍	200～700 L/10a	収穫 30 日 前まで	1 回		1 回
なし (苗木)	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類	2000倍	100～700 L/10a	育苗期			
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～ 3000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000倍					
	アザミウマ類	1000～ 2000倍					
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫	1000倍					
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫14日 前まで			
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～ 2000倍		収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ アザミウマ類	2000倍					
		1000倍					
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～ 2000倍					
	うどんこ病						
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類	1000倍					
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ ナメクジ類		100～300 L/10a	収穫14日 前まで			
	アブラムシ類	1000～ 2000倍					
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ						
	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類	1000倍					
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍			1 回		1 回
セルリー	アブラムシ類 ナモグリバエ			収穫 30 日 前まで	2 回以内		2 回以 内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
いちご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ クロバネキノコバエ類 うどんこ病	1000倍	100～300 L/10a	1番花の 開花まで	1回	散布	1回
すいか	アザミウマ類 うどんこ病 アブラムシ類	1000～ 2000倍		収穫前日 まで	2回以内		2回以 内
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ ツマグロアオカスミカメ	1000倍	100～800 L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ	1000～ 1500倍 1000倍	200～400 L/10a	摘採14日 前まで	1回		1回
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類		100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
チューリップ	アブラムシ類 チューリップサビダニ	1000～ 2000倍 500倍	300L/10a —		掘取後～ 植付前	3回以内 1回	