

平成 31 年 2 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「モーレツフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました除草剤「モーレツフロアブル」が平成 31 年 2 月 13 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : モーレツフロアブル (第 2 4 0 7 6 号)
有効成分・% : ピラクロニル 3.7%
ベンゾビシクロン 3.7%
ベンフレセート 9.2%

登録年月日 : 平成 31 年 2 月 13 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「移植水稻」に使用方法「水口施用」を追加する。
- ・ 作物名「移植水稻」の適用雑草名を「一年生雑草及び多年生広葉雑草 エゾノサヤヌカグサ」に変更する。

<2>注意事項等の変更

【追加】

- (4) 雑草害をもたらす栽培目的以外のイネの防除に使用する場合は、発生前に有効なので、散布適期を失わないように使用すること。また、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- (8) 水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させる。処理後田面水が通常の湛水状態（湛水深3～5cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意すること。

【変更】

- (3) 本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、ウリカワ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまでが本剤の散布適期である。コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまで十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。オモダカ、クログワイは、必要に応じて有効な前処理剤または後処理剤と組み合わせで使用すること。

【変更後の適用表】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植 水 稲	一年生雑草 及び多年生広葉雑草 <u>エゾノサヤヌカグサ</u>	移植後5日～ ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日まで	500mL/10a	1回	原液湛水散布、水口施用 又は無人航空機による滴下

ピラクロニルを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む 農薬の総使用回数	ベンフレセートを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内