

令和元年 10 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ショウチノスケフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「ショウチノスケフロアブル」が令和元年 10 月 9 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ショウチノスケフロアブル（第23594号）
有効成分・% : フルチアニル…………… 1.8%
 メパニピリム…………… 20.0%

登録年月日 : 令和元年 10 月 9 日（適用拡大）

<1>適用内容の変更：

- ・ 作物名「樹木類」（うどんこ病）を追加する。

<2>注意事項等の変更

「人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法」に以下を追加する。

- ・ 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルチアニルを含む農薬の総使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数					
メロン	うどんこ病	2000 倍	100～3000 /10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内	4 回以内					
かぼちゃ													
すいか													
きゅうり	うどんこ病 灰色かび病								3 回以内				
なす													
トマト ミニトマト													
いちご													
花き類 ・観葉植物	うどんこ病								発病前～ 発病初期				5 回以内
樹木類	うどんこ病			200～7000 /10a									

【変更後の「人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法」】

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。