

令和2年11月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「オリオン水和剤40」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オリオン水和剤40」が令和2年11月25日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オリオン水和剤40 (第18504号)
有効成分・% : アラニカルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40.0%

登録年月日 : 令和2年11月25日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「もも」、「ネクタリン」の適用害虫名に「ケムシ類」を追加し、「さくら」の適用害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・ 作物名「もも」、「ネクタリン」、「小粒核果類(うめを除く)」、「うめ」および「さくら」の適用害虫名に「クビアカツヤカミキリ」を追加する。

<2>注意事項等の変更

【追加】

- (8) クビアカツヤカミキリの防除に使用する場合、成虫に直接かかるように散布すること。

【変更後の適用表】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 アゲハ類 ヨモギエダシャク カネタタキ ミカンバエ成虫 クワノミハムシ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	りんご			アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ オオタバコガ ハマキムシ類 カイガラムシ類			
	ケムシ類	1000 ～ 1500 倍					
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
もも	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期 但し、収穫 14 日 前まで			
	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫 14 日前まで			
ネクタリン	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期 但し、収穫 21 日 前まで			
	クビアカツヤカミキリ			収穫 21 日前まで			
ぶどう	チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫 45 日前まで			
かき	アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類	収穫 21 日前まで	1 回	1 回			
小粒核果類 (うめを除く)	アブラムシ類 ケムシ類	収穫 7 日前まで	3 回以内	3 回以内			
	クビアカツヤカミキリ	成虫発生期 但し、収穫 7 日 前まで					

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数	
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 ノコメトガリキリガ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	成虫発生期 但し、収穫 7 日 前まで							
クビアカツヤカミキリ	収穫 7 日前まで			5 回以内	5 回以内			
びわ	アブラムシ類		100～300 L/10a	収穫前日まで	5 回以内		5 回以内	
ばれいしょ	ワタアブラムシ							
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ							
メロン	アブラムシ類 ウリノメイガ							
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類		1000 ～ 1500 倍	200～400 L/10a	収穫 7 日前まで		4 回以内	4 回以内
てんさい	ヨトウムシ テンサイトビハムシ				収穫 14 日前まで		3 回以内	3 回以内
茶	チャノコカクモンハマキ		750 倍	200～400 L/10a	摘採 14 日前まで		5 回以内	5 回以内
きく	アブラムシ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍	100～300 L/10a	発生初期				
さくら	ケムシ類 クビアカツヤカミキリ		200～700 L/10a	成虫発生期				