

令和2年12月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が令和2年12月23日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第21056号)  
有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%

登録年月日 : 令和2年12月23日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 適用病害虫名の追加 : もも、ネクタリン/クビアカツヤカミキリ (1000倍)

<2>注意事項等の変更

【追加】

(6) クビアカツヤカミキリの防除に使用する場合、成虫に直接かかるように散布すること。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 クワコナカイガラムシ	2000倍	200～700 L/10a	収穫 30 日 前まで	1 回	散布	1 回
なし (苗木)	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類	2000倍	100～700 L/10a	育苗期	2回以内		2回以内
かんきつ	ミカンサビダニ	2000～ 3000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで			
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000倍					
	アザミウマ類	1000～ 2000倍					
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫	1000倍					
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫14日 前まで			
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ アザミウマ類	2000倍		成虫発生 期 但し、収 穫前日ま で			
	クビアカツヤカミキリ	1000倍					
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～ 2000倍		収穫前日 まで			
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類	1000倍		100～300 L/10a			
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ ナメクジ類						
はくさい	アブラムシ類	1000～ 2000倍					
	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000倍					
レタス	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類		1000倍				
	非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍		1 回	1 回	

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
セルリー	アブラムシ類 ナモグリバエ	2000倍	100～300 L/10a	収穫 30 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内
いちご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ クロバネキノコバエ類 うどんこ病	1000倍	100～300 L/10a	1 番花の 開花まで	1 回		1 回
すいか	アザミウマ類 うどんこ病	1000～ 2000倍		100～300 L/10a	収穫前日 まで		2 回以内
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ ツマグロアオカスミカメ		1000倍				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～ 1500倍	200～400 L/10a	摘採14日 前まで	1回		1回
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ	1000倍					
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000～ 2000倍	300L/10a	3回以内	15分 間球 根浸 漬		4回以内
チューリップ	アブラムシ類						
	チューリップサビダニ						