

令和3年1月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「オンコル粒剤5」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オンコル粒剤5」が令和3年1月27日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オンコル粒剤5 (第16575号)  
有効成分・% : ベンフラカルブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.0%

登録年月日 : 令和3年1月27日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「しゃりんばい」及び「むくげ」を「樹木類 (つつじ類を除く)」に変更し、適用害虫名「ナシミドリオオアブラムシ」及び「ワタアブラムシ」を「アブラムシ類」に変更する。
- ・ 作物名「つつじ類」に適用病害虫名「アブラムシ類」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネトノヨイムシ イネヒカモグリハエ イネモグリハエ	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 50) 1 箱当り 30～60g	移植前 3 日～ 移植当日	1 回	育苗箱の 上から均一に 散布する。	1 回
	ツマクノコバノイ ヒメトビウカ セジロウカ	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 50) 1 箱当り 50～80g				
	イネシガレセンチュウ	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 50) 1 箱当り 60g				
とうがらし類	ミナキイロアザミウマ	0.5g/株	育苗期後半 又は定植時	1 回	株元散布	1 回
ひろしまな	アオムシ モモカアブラムシ	1g/株	育苗期後半			
メキャベツ 非結球メキャベツ	アブラムシ類		定植時			
らっかせい		9 kg/10a	は種時	1 回	全面土壌混和	3 回以内 (植付 時の土壌混和は 1 回以内、培土 時の土壌混和及 び株元散布は合 計 1 回以内、散 布は 1 回以内)
さといも	コガネムシ類幼虫	6～9 kg/10a	生育期 但し、 収穫 60 日前まで		株元土壌混和	
	アブラムシ類		植付時		植溝土壌混和	
さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチュウ類	9 kg/10a	植付時	1 回	株元散布又は 株元土壌混和	1 回
	コガネムシ類幼虫 メイチュウ類	4～6 kg/10a				
	カンシヤコバネカガムシ	6 kg/10a	収穫 100 日前まで	1 回	散布	
飼料用さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチュウ類	6～9 kg/10a	植付時	1 回	植溝土壌混和	1 回
	コガネムシ類幼虫 メイチュウ類	9 kg/10a	培土時		株元散布又は 株元土壌混和	
	コガネムシ類幼虫 メイチュウ類	4～6 kg/10a				
花き類・ 観葉植物 (きく、 ストックを除く)	アザミウマ類	6 kg/10a	生育期	3 回以内	株元散布	4 回以内
きく	ミナキイロアザミウマ	6～9 kg/10a	定植時	1 回	植溝土壌混和 又は株元散布	
	ミナキイロアザミウマ	9 kg/10a	生育期	3 回以内	株元散布	
ストック	コガ	0.5g/株	定植時	1 回	全面土壌混和	
	アザミウマ類				株元散布	
樹木類 (つつじ類 を除く)	アブラムシ類	6 kg/10a	生育期	3 回以内	株元散布	
つつじ類	コガネムシ類幼虫	9 kg/10a				定植時
	たばこ	アブラムシ類	6 kg/10a	1 回	作条土壌混和	
アザミウマ類		3～6 kg/10a				