

除草剤・植物成長調整剤 登録番号 第19011号

シアノット®

(シアン酸塩水溶剤)



- 有効成分 シアン酸ナトリウム 80.0%
- 性 状 類白色水溶性粉末
- 毒 性 普 通 物
- 有効年限 3 年
- 包 装 5kg×4袋／ケース

## 【特 長】

1. 効果が速く現れます。
2. 散布後、有効成分は速やかに二酸化炭素とアンモニアに分解されます。
3. 本剤は浸透移行性がないので、作物体への移行がありません。

## 【適用雑草と使用方法】

| 作物名                                  | 適用場所                                       | 適用雑草名        | 使用時期                          | 使用量                 |              | 本 剤 の<br>使用回数 | 使用方法                                 | シアン酸ナトリウム<br>を含む農薬の<br>総 使 用 回 数   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                      |                                            |              |                               | 薬 量                 | 希 釈 水 量      |               |                                      |                                    |
| ば れ い し ょ                            | －                                          | 畑地一年生<br>雑 草 | 雑草生育初期                        | 3kg/10a             | 100ℓ<br>/10a | 2回以内          | 畦間茎葉<br>散布                           | 3回以内<br>(ばれいしょの<br>茎葉へ散布は<br>1回以内) |
| キ ャ ベ ツ                              |                                            |              | 雑草生育期<br>(草丈5cm以下)<br>定植後畦間処理 |                     |              | 1回            | 雑草茎葉<br>散布                           | 1回                                 |
| 球 根 花 き<br>花 木                       |                                            |              | 雑草生育初期                        | 5～15g<br>/3.3㎡      | 株間散布         | 3回以内          | 株間散布                                 | 3回以内                               |
| 桑<br>こ<br>う<br>ぞ<br>み<br>つ<br>ま<br>た |                                            |              |                               | 70～<br>100ℓ<br>/10a |              |               |                                      |                                    |
| 樹 木 等                                | 公園<br>庭園<br>堤とう<br>駐車場<br>道路<br>運動場<br>宅地等 | 雑草生育初期       | 3～4.5kg<br>/10a               |                     |              |               | 植栽地を<br>除く樹木<br>等の周辺<br>地に雑草<br>茎葉散布 |                                    |

| 作物名   | 使用目的 | 使用量           |              | 使用時期  | 本 剤 の<br>使用回数 | 使用方法            | シアン酸ナトリウム<br>を含む農薬の<br>総 使 用 回 数 |
|-------|------|---------------|--------------|-------|---------------|-----------------|----------------------------------|
|       |      | 薬量            | 希釈水量         |       |               |                 |                                  |
| ばれいしょ | 茎葉枯凋 | 2～3kg<br>/10a | 100ℓ<br>/10a | 茎葉黄変期 | 1回            | ばれいしょの<br>茎葉へ散布 | 3回以内 (ばれい<br>しょの茎葉へ散<br>布は1回以内)  |

## 【使用上の注意】



1. 除草剤として使用する場合は、以下のことに注意してください。
  - ①使用濃度は最低2～3%液とし雑草の幼少時（草丈10cm以内の時期）に散布してください。  
草丈が大きい場合は適宜薬量と散水量を増やしてください。
  - ②作物に薬液が付着すると薬害を生じるので、薬液が作物にかからないように十分注意して散布してください。
  - ③作物の幼苗時の使用は避けてください。
  - ④所要量を10アール当り70～100ℓの水に加え、十分かき混ぜた後、散布機またはジョロで散布してください。
2. ばれいしょの枯凋剤として使用する場合は、以下のことに注意してください。
  - ①高温が続く場合の散布や乾燥になりやすい土壌での使用は避けてください。
3. 降雨や降雨前後の散布は避けてください。
4. 散布液の飛散あるいは本剤の流出によって、有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
5. 蚕に影響があるので、桑葉にかからないように注意してください。
6. 散布液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
7. 公園、提とう等で使用する場合は、特に以下のことに注意してください。
  - ①水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意してください。
8. 散布器具、容器の洗浄水（及び残りの薬液）は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないように適切に処理してください。
9. 誤飲、誤食などのないよう注意してください。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。  
使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
10. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
11. 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。
12. 公園、提とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
13. 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

## 【貯蔵上の注意】

直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。