

令和元年 6 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

## 「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が令和元年 6 月 26 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第 20818 号)  
有効成分・% : トルフェンピラド ..... 15.0%

登録年月日 : 令和元年 6 月 26 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「だいこん」の適用害虫名に「ダイコンサルハムシ」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数			
キャベツ	アザミウマ類	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内			
	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類	1000～2000 倍								
はくさい	ナメクジ類	1000 倍								
	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000～2000 倍								
レタス	ナメクジ類 べと病	1000 倍								
	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ ダイコンサルハムシ	2000 倍						収穫 30 日前まで	1 回	1 回
かぶ	キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類	2000 倍						収穫 7 日前まで		
きゅうり	ウリノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000～2000 倍						収穫前日まで	2 回以内	2 回以内
	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000 倍								
にがうり	アザミウマ類									
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～2000 倍								
	コナジラミ類 うどんこ病	1000 倍								
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ	2000 倍								
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ アブラムシ類 さび病 べと病	1000 倍	収穫 7 日前まで							
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000～2000 倍								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト®を含む農薬の総使用回数
ピーマン	アザミウマ類	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	1 回	散布	1 回
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病	1000 倍					
にんにく	ネギコガ アザミウマ類 アブラムシ類 チューリップサビダニ			1000 倍	収穫 7 日前 まで		2 回以内
	にら		ネギアザミウマ		収穫 14 日前 まで		
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500 倍	200 ～ 400 L/10a	摘採 14 日 前まで	1 回		1 回
	チャトゲコナジラミ マダラカサハラハムシ ツマグロアオカスミカメ	1000 倍					
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	発生初期	4 回以内	4 回以内	
	白さび病			発病初期			