

令和元年 7 月 吉日

各 位

OAT アグリオ株式会社

「サンヨール」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「サンヨール」が令和元年 7 月 10 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : サンヨール（第 9 6 2 5 号）
有効成分・% : DBEDC 20.0%

登録年月日 : 令和元年 7 月 10 日（適用拡大）

<1>適用内容の変更：

- ・ 「トマト、ミニトマト」の適用病害虫名「うどんこ病」の希釈倍数「500倍」を「500～700倍」に変更する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDCを含む農薬の総使用回数					
麦類	うどんこ病	400~500倍	60~ 150L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内					
小麦	赤かび病	400倍										
さやえんどう 実えんどう	うどんこ病 灰色かび病	500倍	100~ 300L/10a	収穫前日ま で	4回以内		4回以内					
なす	うどんこ病 すすかび病	700倍										
トマト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類	500倍										
	うどんこ病	500~700倍										
ピーマン 甘長とうがらし	うどんこ病 アブラムシ類	500倍						—	定植前	1回	6回以内(定 植前の苗浸 漬は1回以 内)	
きゅうり	べと病 うどんこ病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類											
	すいか メロン うり類(観物用) にがうり											うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類
かぼちゃ ズッキーニ	うどんこ病											800倍
いちご						500~1000倍						5分間苗浸漬
	花き類・観葉植物 (きく、ばら、ペチュ ニア、スターチス、プリムラ、 パンジーを除く)	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類				100~ 300L/10a		発生初期	8回以内	8回以内		
きく		うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 白さび病 黒斑病 アブラムシ類 ハダニ類										
ばら	うどんこ病	500~1000倍	100~ 300L/10a	発生初期	8回以内	8回以内						
	灰色かび病 黒星病 アブラムシ類 ハダニ類 チュウリンジハバチ	500倍										

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDCを含む農薬の総使用回数
ペチュニア	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	100～ 300L/10a	開花期まで	8回以内	散布	8回以内
	ナメクジ類	250～500倍					
スターチス プリムラ パンジー	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	200～ 700L/10a	発生初期	8回以内	散布	8回以内
樹木類(つつじ類を除く)	うどんこ病 アブラムシ類						
つつじ類	ツツジグンバイ ツツジコシラミ うどんこ病 アブラムシ類						
たばこ	うどんこ病	300～500倍	25～ 180L/10a	—	2回以内	散布	2回以内
日本芝	葉腐病(ジバク) さび病		0.5L/m ²	発生初期	8回以内		8回以内