

令和2年2月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「オーシャインフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「オーシャインフロアブル」が令和2年2月25日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オーシャインフロアブル (第22627号)
有効成分・% : オキスポコナゾールフマル酸塩 20.0%

登録年月日 : 令和2年2月25日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「かんきつ (みかんを除く)」 (灰色かび病及びそうか病) を追加する。
- ・ 作物名「みかん」 (灰色かび病及びそうか病) を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	オキシポコナゾール フマル酸塩を 含む農薬の 総使用回数
りんご	赤星病 黒星病 モニリア病 うどんこ病	3000倍	200～ 700 L/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
かんきつ (みかんを 除く)	灰色かび病 そうか病	2000倍		収穫前日ま で			
みかん							
おうとう	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病	3000倍			3回以内		
小粒核果類 (うめを除く)	灰星病						
うめ	黒星病	2000～3000倍		3回以内			
	すす斑病	2000倍					
	灰星病	3000倍					
もも ネクタリン	灰星病 黒星病	2000～3000倍		2回以内			
	ホモプシス腐 敗病	2000倍					
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病		2000倍	収穫7日前 まで	2回以内	2回以内	
なし	赤星病 黒星病	3000倍	収穫前日ま で	5回以内	5回以内		