

令和2年6月10日

各 位

OATアグリオ株式会社

サンヨール
登録変更（作物削除）についてのお願い

サンヨール（農林水産省登録 第9625号）につきましては、メーカー側の自主的な判断として、一部の登録作物について削除し、登録変更する申請を行い、令和2年6月10日付で認可されました。

このため、生産者の皆様におかれましては、今後、下記の登録内容にてご使用いただきますようお願い申し上げます。

記

商品名 : サンヨール（第9625号）

有効成分・% : DBEDC 20.0%

変更年月日 : 令和2年6月10日（登録変更（作物削除））

お願い

作物名が削除された作物（麦類・小麦）では使用しないでください。

○変更登録内容 作物名から下記の作物を削除する

麦類	小麦
----	----

変更後の適用表は別紙のとおりです。

その他の使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご覧ください。

【変更後の適用表】

サンヨール (第9625号)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDCを含む農薬の総使用回数				
さやえんどう 実えんどう	うどんこ病 灰色かび病	500倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内				
なす	うどんこ病 すすかび病	700倍									
トマト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類	500倍									
	うどんこ病	500～700倍									
ピーマン 甘とうがらし	うどんこ病 アブラムシ類	500倍									
きゅうり	べと病 うどんこ病 コナジラミ類 アブラムシ類 ハダニ類										
	すいか メロン うり類 (観物用) にがうり										
	かぼちゃ ズッキーニ										
いちご	うどんこ病							—	定植前	1回	瞬間～5分 間苗浸漬 5分間苗浸漬
	800倍	—						—	—	—	
	500～1000倍										
灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	—	—	—	—	—					
							—				
花き類・観葉植物 (きく、ぼら、ペチュ ニア、スターチス、プリムラ、 パンジーを除く)	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	100～ 300L/10a	発生初期	8回以内	散布	8回以内				
きく	うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 白さび病 黒斑病 アブラムシ類 ハダニ類										
	ぼら							うどんこ病 灰色かび病 黒星病 アブラムシ類 ハダニ類 チュウリンシハバチ			
ペチュニア		うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	100～ 300L/10a	開花期ま で	8回以内	散布	8回以内			
	ナメクジ類	250～500倍									
スターチス プリムラ パンジー	うどんこ病 灰色かび病 アブラムシ類 ハダニ類	500倍	200～ 700L/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内				
樹木類(つつじ類 を除く)	うどんこ病 アブラムシ類										
つつじ類	ツツジゲンバイ ツツジコナジラミ うどんこ病 アブラムシ類										
たばこ	うどんこ病										
日本芝	葉銹病(ゾバツカ) さび病	300～500 倍	0.5L/m ²	発生初期	8回以内	8回以内					