

朝まけば、その日にわかる!

即日除草 プリグロックス[®]L



イオンの力で、雑草の細胞を破壊!

- スギナも撃退、芯まで枯れる!
- 土壌生物に影響が少ない!
- 気温が低くても効果が安定!

 **プリグロックス[®]L**



要印鑑 安全な登録農薬を使いましょう! 安全使用推進運動展開中
きちんと。ただしく。農薬は必ずカギをかけて保管しましょう。ラベルをよく読んで正しく使いましょう。

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標



- スギナも撃退、芯まで枯れる!
- 土壌生物に影響が少ない!
- 気温が低くても効果が安定!

適用作物及び適用場所・雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートをを含む農薬の総使用回数
				重量 (nL/10a)	希釈水量 (L/10a)				
移植水稲	-	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800~1000	100~150	1回	-	1回	2回以内
直播水稲			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000					
麦類	圃場内の周縁部	一年生雑草	は種前又はは種後出芽前	1000~2000	-	4回以内	-	4回以内	4回以内
さとうきび			雑草生育期						
未成熟とうもろこし	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
とうもろこし(子実)			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで (草丈30cm以下)						
大豆(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600~1000	-	2回以内	-	2回以内	2回以内
だいず			は種前又は種付前						
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下)	600~1000	-	4回以内	-	4回以内	4回以内
えだまめ			は種前又は種付前						
ばれいしょ	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	400~800	-	2回以内	-	2回以内	2回以内
かんしょやまのいも			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
さといも	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	400~600	-	2回以内	-	2回以内	2回以内
こんにやく			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
果樹類(かんきつを除く)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	400~600	-	2回以内	-	2回以内	2回以内
かんきつ			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
いちご	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	400~600	-	2回以内	-	2回以内	2回以内
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花種)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
キャベツ、カリフラワー、だいこん、ごぼう	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで	600~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
トマト、きゅうり、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ			は種前又は種付前						
アスパラガス	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	600~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
ふき			は種前又は種付前						
みょうが(花種)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで	600~1000	-	2回以内	-	2回以内	2回以内
みょうが(茎葉)			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
うど	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫75日前まで	100~150	-	4回以内	-	4回以内	4回以内
はとむぎ			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
パセリ、やまのいも(むかご)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫7日前まで	1000~2000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
たけのこ			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
茶	-	一年生及び多年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	800~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
桑			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
たばこ	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	800~1000	-	1回	-	1回	1回
チューリップ			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
花き類・観葉植物(チューリップ、すいせんを除く)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	600~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
すいせん			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
樹木類	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	600~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
水田作物(畑作物)(休耕田)			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
水田作物(水田畦畔)	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	600~1000	-	5回以内	-	5回以内	5回以内
樹木等			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						
公園、庭園、遊歩道、駐車場、道路、宅地、のり面等	-	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	800~1000	-	3回以内	-	3回以内	3回以内
スギナ			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで						

作物名	使用目的	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートをを含む農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株の枯殺	1nL/株	第2葉展開期から開花20日後まで	1回/罹病株	ウイルス罹病株葉への滴下	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。



コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00・13:00~17:00 土日祝日を除く)