

ナメクジ駆除剤 スラゴ[®]

登録番号 第21929号

(燐酸第二鉄粒剤)



- 有効成分 燐酸第二鉄水和物 0.98% (鉄として 0.28%)
- 性 状 淡緑色粒状
- 毒 性 普通物
- 有効年限 5 年
- 包 装 450g×20 本／ケース 2kg×8 袋／ケース

【特 長】

1. 有効成分の燐酸第二鉄は天然に存在する成分で、作物の株元にも散布できます。
2. 雨・湿気で崩れにくい製剤です。
3. 天敵、有用昆虫に対する影響が少なく、IPM（総合的病害虫管理）に適しています。
4. 収穫直前まで使えます。
5. 特別栽培農産物においても使用回数をカウントされない農薬です*。
(* 各地方自治体の定める認定機関判断によりますので、ご不明な場合は関係機関にお問い合わせください)
6. 有機農産物の日本農林規格（有機 JAS）に適合する農薬です。

【適用害虫と使用方法】

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本 剤 の 使用回数	使用方法	燐酸第二鉄 を含む農薬の 総 使用回数
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等	温室 ハウス 圃場 花壇	ナメクジ類 カタツムリ類	1～5g/m ²	発生時	－	ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ及びヒメリンゴマイマイの発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置	－
		アフリカマイマイ	3～5g/m ²				
		ヒメリンゴマイマイ	5g/m ²				

【上手な使い方】

1. なるべく日中、高温時の使用を避け、ナメクジ・カタツムリ類が活動を始める夕刻に使用してください。
2. 被害発生時期の 2 週間前（～1 か月前）、圃場全体にばら撒いてください。
3. 処理後に被害があればナメクジの密度が高いと考えられるので、再度処理してください。

【使用上の注意】

1. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

2. 作物体上に本剤がかからないように作物周辺あるいは株元の土壌表面に処理してください。作物体上に粒が残った場合は払い落としてください。(収穫時の異物混入・葉害)
3. 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。

【貯蔵上の注意】

直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。