

殺菌剤



殺菌剤分類 3

オーシャイン® フロアブル



フロアブル化により果面の汚れが軽減



®はOATアグリオ(株)の登録商標

殺菌剤 オーシャイン[®]フロアブル

農林水産省登録 第22627号 成分:オキシポコナゾールフマル酸塩…20.0%
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称) 包装:500ml×20本/ケース

オーシャインフロアブルの特長

1 広い殺菌スペクトラム
広い殺菌スペクトラムを持ち病害の同時防除が可能です。

2 優れた作用特性による安定した効果
予防、治療効果の両作用を持ち、散布適期幅が広いDMI剤です。

3 汚れが少ないフロアブル製剤
果面の汚れが少なく安心して使用できます。

適用病害及び使用方法

2024年4月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(10a当り)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシポコナゾールフマル酸塩を含む農薬の総使用回数	
りんご	うどんこ病、赤星病 黒星病、モニリア病	2000~3000	200~700ℓ	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内	
かんきつ (みかんを除く) みかん	灰色かび病 そうか病 貯蔵病害(緑かび病)	2000						
おうとう	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病	3000						
小粒核果類 (うめを除く)	灰星病			収穫前日まで	3回以内			3回以内
うめ	黒星病	2000~3000						
	すす斑病	2000						
	灰星病	3000						
もも	灰星病 黒星病	2000~3000						
	ホモブシス腐敗病	1000~2000						
ネクタリン	灰星病 黒星病	2000~3000						
	ホモブシス腐敗病		収穫7日前まで	2回以内	2回以内			
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病	2000						
なし	赤星病、黒星病	3000	収穫前日まで	5回以内	5回以内			

上手な使い方 ●ぶどうに使用する場合、萌芽直後～新葉展開初期に高濃度で散布すると葉に薬害を生じるおそれがあるので使用濃度を厳守してください。

⚠ 使用上の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- ぶどうで使用する場合、無袋栽培では果実肥大中期(大豆大)以降、有袋栽培では果実肥大中期(大豆大)から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱が生じることがあるので注意してください。
- 周辺の作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
- 空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
- 使用に当たっては、所定の希釈倍数を厳守し、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。

貯蔵上の注意

直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。

取扱い



OAT アグリオ株式会社

https://www.oat-agrio.co.jp/
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター
☎ 0120-210-928
(9:00~12:00・13:00~17:00 土日・祝日を除く)