



水稲育苗箱専用殺虫・殺菌剤

農林水産省登録
第23442号

殺虫剤分類 2B 1A

殺菌剤分類 P2

オーベストオリゼ10 箱粒剤

クロラントラニリプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤



水稲病害虫を3つのパワーで防除!



イネミズゾウムシ



イネドロオイムシ



イネシンガレセンチュウ



セジロウンカ



ツマグロヨコバイ



ニカメイチュウ



フタオビコヤガ



コブノメイガ



いもち病

®はOATアグリオ(株)の登録商標



OATアグリオ株式会社

水稲病害虫から3つのパワーで守る!

オーベストオリゼ10 箱粒剤

有効成分：クロラントラニプロール…0.75% ベンフラカルブ…6.0% プロベナゾール…10.0%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指すという通称） 有効期限：5年 包装：1kg×12袋（ケース）

特長

クロラントラニプロールの特長

- 1.新しい作用性（筋収縮制御）を有するジアミド系新規殺虫剤です。
- 2.フタオビコヤガ、コブノメイガおよびニカメイチュウ等のチョウ目害虫、更にはイネドロオウムシ、イネミズゾウムシおよびツマグロヨコバイ等を長期間防除します。

ベンフラカルブの特長

- 1.広いスペクトラムを有するカーバメート系殺虫剤です。
- 2.イネミズゾウムシ等のコウチュウ目害虫、チョウ目、ハエ目、更にはセジロウンカおよびツマグロヨコバイ等の吸汁性害虫に対して安定した効果を示します。

プロベナゾールの特長

- 1.イネの病害抵抗性を誘導し、いもち病に対して長期間効果が持続します。

適用害虫および使用方法

2022年12月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ イネシンガレセンチュウ セジロウンカ	育苗箱 (30×60×3cm、) 使用土壌約5ℓ 1箱当り50g	移植前3日 ～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	1回	2回以内 (移植時までの 処理は 1回以内)
	ヒメトビウンカ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ コブノメイガ いもち病	高密度には種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、) 使用土壌約5ℓ 1箱当り50～100g	移植当日					

⚠ 使用上の注意事項

1. 本剤を使用した場合、カルボスルファンを含む剤は使用しないでください。
2. 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
3. 育苗箱の上から所定薬量を均一に散布し、莖葉に付着した薬剤を払い、培土に定着させるために軽く散水して田植機にかけて移植してください。
4. 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
5. 苗の葉がぬれていると薬剤が付着して薬害を生じる場合もあるので、散布直前の灌水はさけてください。
6. 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので必ず健苗を用いてください。
7. 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはいないに行い、移植後は湛水状態(湛水深3～5cm)を保ち、稲苗が活着するまで田面が露出しないよう、水管理に注意してください。また、深植にならないように注意してください。
8. 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさけてください。
9. 本田への移植後低温が続く、苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけてください。また、移植後極端な高温が続くと予測される場合も使用をさけてください。
10. 誤って過剰に使用すると生育初期の葉の黄化や生育遅延などの薬害を生じるおそれがあるので、所定の使用量、使用時期、使用方法を守ってください。
11. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
12. 誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けてください。
13. ベンフラカルブによる中毒に対しては硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
14. 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。
15. 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
16. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
17. かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
18. 夏期高温時の使用はさけてください。
19. 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、本剤を使用した苗は養魚田には移植しないでください。
20. 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
21. 移植後は、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
22. 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

【貯蔵上の注意事項】直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し、子供の手の届かない場所に密封して保管してください。

■ラベルをよく読む。■記載以外には使用しない。■小児の手の届く所には置かない。■使用量に合わせて秤量し、使いきる。■空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。■防除日誌を記帳する。

取扱い



OAT アグリオ株式会社

https://www.oat-agrio.co.jp/
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター
☎ 0120-210-928
(9:00~12:00・13:00~17:00 土日・祝日を除く)