

養液栽培用肥料

OATハウス肥料®

● 包 装	OATハウス1号 10kgポリ袋入り	OATハウス5号 1kgポリ袋入り×10袋／ケース
	OATハウスS1号 〃	OATハウス6号 10kgポリ袋入り
	アミノハウス1号 〃	OATハウス7号 〃
	アミノハウスS1号 〃	OATハウス8号 〃
	OATハウス2号 〃	OATハウス9号 〃
	OATハウス3号 〃	OATハウス10号 〃

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。

[OATハウス肥料一覧]

OATハウス 1 号
生第92893号



OATハウス S 1 号
生第92891号



アミノハウス 1 号
指定配合肥料



アミノハウス S 1 号
指定配合肥料



OATハウス 2 号



OATハウス 3 号
生第78297号



OATハウス 5 号
生第68572号



OATハウス 6 号



OATハウス 7 号
輸第9845号



OATハウス 8 号
生第69603号



OATハウス 9 号
輸第9846号



OATハウス 10 号



[OATハウス肥料の成分組成]

製品名	保証成分 (%)						配合成分 (%)					
	窒素 N	りん酸 P ₂ O ₅	加里 K ₂ O	苦土 MgO	マンガン MnO	ほう素 B ₂ O ₃	石灰 CaO	鉄 Fe	銅 Cu	亜鉛 Zn	モリブデン Mo	
OATハウス1号	10.0	8.0	27.0	4.0	0.10	0.10		0.18	0.002	0.006	0.002	
OATハウスS1号	9.0	7.0	32.0	4.0	0.05	0.07		0.15	0.002	0.006	0.002	
アミノハウス1号*	10.0	8.0	27.0	3.5	0.10	0.07		0.18	0.002	0.006	0.002	
アミノハウスS1号*	9.0	7.0	32.0	3.5	0.05	0.07		0.15	0.002	0.006	0.002	
OATハウス2号	11.0						23.0					
OATハウス3号	13.0		46.0									
OATハウス5号	6.0		9.0		2.00	2.00		5.7	0.04	0.08	0.043	
OATハウス6号				16.0								
OATハウス7号	11.0	61.0										
OATハウス8号	10.0	9.0	40.0									
OATハウス9号		51.0	33.0									
OATハウス10号			53.0									

*アミノ酸、有機酸を含む。（詳細はP167の通り）

[標準培養液の調整方法と特徴]

培養液処方例 (g/1000ℓ)

肥料名	A処方	SA処方	C処方	SC処方	B処方
OATハウス1号 (アミノハウス1号 ^{*1})	1500		1500		
OATハウスS1号 (アミノハウスS1号 ^{*1})		1500		1500	
OATハウス2号	1000	1000	800	800	950
OATハウス3号					810
OATハウス5号					50
OATハウス6号					500
OATハウス7号					155
OATハウス8号			200		
OATハウス9号 ^{*3}	B処方のアンモニア性窒素を少なくする時は7号の一部を9号に置き換える またりん酸と加里を強化したい時は培養液1トンあたり100～200gを添加する				
OATハウス10号 ^{*3}	加里だけを強化したい時は培養液1トンあたり100～200gを添加する				

備考：各培養液処方ともEC1.3dS/m以下の低濃度で使用する場合は、OATハウス5号を培養液1000ℓあたり、20～30g程度追加してください。

*1) アミノハウス1号、アミノハウスS1号は、葉菜類向けのアミノ酸・有機酸入り肥料です。培養液の調整方法はOATハウス1号と同じです。

*2) OATハウス9号、OATハウス10号は、各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。

培養液処方の特長

- A 処 方 ： 果菜類、葉菜類、花き類に広く使用できる汎用型培養液処方です。
- S A 処 方 ： トマトの尻腐れやレタスのチップバーンなど、高温による生理障害が発生しやすい時期の果菜類、葉菜類に対応した培養液処方です。
- C 処 方 ： アンモニア性窒素を適度に関ひ、秋から春の果菜類に対応した培養液処方です。
- S C 処 方 ： 原水にカルシウムを多く含む場合や、高温による生理障害が発生しやすい時期の果菜類、葉菜類に対応した培養液処方です。
- B 処 方 ： 汎用性の高い園試処方です。

〔標準培養液の濃度〕

標準培養液の成分組成 (ppm)

成分名	A処方	SA処方	C処方	SC処方	B処方
窒 素 全 量 (TN)	260	247	258	225	230
内アンモニア性窒素 (AN)	23	(8)	23	(8)	20
硝 酸 性 窒 素 (NN)	233	239	231	217	210
リ ン 酸 (P_2O_5)	120	105	138	105	93
加 里 (K_2O)	405	480	485	480	377
石 灰 (CaO)	230	230	184	184	219
苦 土 (MgO)	60	60	60	60	80
マ ン ガ ン (MnO)	1.5	0.75	1.5	0.75	1.0
ほ う 素 (B_2O_3)	1.5	1.1	1.5	1.1	1.0
鉄 (Fe)	2.7	2.3	2.7	2.3	2.9
銅 (Cu)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
亜 鉛 (Zn)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.04
モ リ ブ デ ン (Mo)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
E C 値 (dS/m)	2.6	2.6	2.7	2.4	2.4

注) EC値は水道水 (EC0.11dS/m、水温25℃) に溶解し、測定しました。

標準培養液のme濃度 (me/ℓ)

成分名	A処方	SA処方	C処方	SC処方	B処方
窒 素 (N)	18.6	17.6	18.4	16.0	16.4
リ ン (P)	5.1	4.4	5.8	4.4	3.9
カ リ ウ ム (K)	8.6	10.2	10.3	10.2	8
カ ル シ ウ ム (C a)	8.2	8.2	6.6	6.6	7.8
マ グ ネ シ ウ ム (M g)	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0

各濃度ともに保証成分より算出してあり、実際の濃度は表中の値より若干高濃度になります。

【濃厚原液の調製法】

濃厚原液タンクが2基あり、調節装置で給肥する場合、以下のような割合で肥料を秤量し、所定のタンクへ入れて溶解してください。

標準培養液20トン分の原液（100倍希釈用濃厚原液：200ℓタンク）の使用量

濃厚原液タンク	A処方	SA処方	C処方	SC処方	B処方
1号タンク	1号 30kg	S1号 30kg	1号 30kg 8号 4kg	S1号 30kg	3号 16.2kg 5号 1kg 6号 10kg 7号 3.1kg
2号タンク	2号 20kg	2号 20kg	2号 16kg	2号 16kg	2号 19kg

【OATハウス肥料の使い方】

培養液の設定濃度は、栽培される作物や養液栽培装置により異なりますが、標準培養液の0.5～2倍程度で使用してください。

培養液のEC管理例（dS/m）

作物名	育苗期	本 圃		
		定植初期	中期（交配期）	収穫期～後期
トマト	1.2	1.2～1.5	1.2～1.8	2.0～2.8
なす・ピーマン	1.2	1.2～1.5	1.5～1.8	1.8～2.4
きゅうり	1.2	1.2～1.5	1.5～1.8	1.8～2.4
メロン	1.2	1.2～1.5	2.0～2.4	1.2～1.5
いちご	0.6～0.8	0.6～1.0	0.8～1.2	0.8～1.5
みつば・ねぎ	1.2	1.2～3.5	1.5～3.5	2.4～3.5
サラダナ	1.2	1.2～3.0	1.2～3.0	1.2～3.0
ばら・カーネーション	1.2	1.0～1.5	1.2～1.8	1.5～2.0

備考：表中のEC値は一例です。高温期はやや低く、低温期はやや高く管理するのが一般的です。また栽培途中で培養液の肥料成分バランスが大幅に違ってきた時や、病原菌等で汚染された時は、速やかに培養液を全量交換してください。

【培養液管理のポイント】

1. 原水の水質

原水のECが0.15dS / m 以下の時は、一般に基本処方に対応します。

ECが0.15dS / m 以上の時は、分析を行い修正処方を選択します。

2. pH 管理

培養液の pH は 5.0 ～ 6.5 の範囲で管理します。pH が 6.5 以上になると、マンガンや鉄等の微量元素欠乏が発生しやすくなります。また pH が 5.0 以下になると、カルシウムなどの吸収が悪くなります。培養液 pH の調整には「PH 調整剤アップ」、「PH 調整剤ダウン」をご使用ください。

3. 給液管理

各種栽培システムに応じた適切な給液管理が必要です。作物の生育に最適な根圏環境となる給液管理をしてください。

4. 液温管理

肥料各成分の吸収量は根圏温度により大きく異なってきます。栽培作物の根圏部が好適温度に保てるよう、培養液の液温を管理してください。

5. 微量要素欠乏対策

アミノサンビの 500 倍（単用）～ 1000 倍（農薬混用）の葉面散布をしてください。

アミノハウス1号、アミノハウスS1号の特長

「アミノハウス1号」「アミノハウスS1号」は、養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。

1. 葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。

2. 生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。

3. 無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。

【使用上の注意】

1. アルカリ性農薬、アルカリ資材等とは混用しないでください。

2. 幼児等の手の届く所に置かないでください。

3. 施肥作業後は洗眼やうがいをし、皮ふへの付着物を洗い流してください。

4. 眼に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

5. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

6. 肥料以外の用途には使用しないでください。

【貯蔵上の注意】

1. 開封したまま放置すると吸湿しますので、袋の口を密封してください。

2. 保管は直射日光を避け、冷涼乾燥したところで、荷崩れが起こらないようにしてください。