

殺虫剤 登録番号 第21056号



## ハチハチフロアブル

(トルフェンピラド水和剤)

有効成分	トルフェンピラド 15.0%
性状	類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性	劇物
有効年限	3年
包装 (1ケース)	500ml×20本
化管法	トルフェンピラド (1種) 15.0%

### 特長

- アブラムシの種類に関係なく、全てのアブラムシに優れた効果を示します。
- 近年発生増加傾向にあるなしのニセナシサビダニ、かんきつのミカンサビダニ、チャノホコリダニ、もものモモサビダニに対して卓効を示します。
- かんきつのチャノキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマ及びネギアザミウマに優れた効果を示します。
- もものシンクイムシ類、モモハモグリガ对中国して優れた効果を示します。
- さやえんどう、実えんどうのナモグリバエに優れた効果を示します。

### 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラド を含む農薬の 総使用回数
なし	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 クワコナカイガラムシ チュウゴクナシキジラミ	2000	200~700ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	散布	1回
なし (苗木)	アブラムシ類 ニセナシサビダニ アザミウマ類 チュウゴクナシキジラミ	2000	100~700ℓ/10a	育苗期	2回以内		2回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラド を含む農薬の 総使用回数					
かんきつ	サビダニ類	2000～3000	200～700ℓ/10a	収穫前日まで								
	アブラムシ類 チャノホコリダニ カネタタキ	2000										
	アザミウマ類	1000～2000										
	ゴマダラカミキリ コナカイガラムシ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシャク ヨコバイ類 ミカンバエ成虫 ナメクジ類	1000										
	アブラムシ類	2000										
	シンケイムシ類	1000～2000										
	アブラムシ類 モモハモグリガ モモサビダニ	2000										
	アザミウマ類	1000										
	クビアカツヤカミキリ											
すもも	アブラムシ類	2000	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで								
もも ネクタリン	アザミウマ類	1000～2000		収穫前日まで								
	クビアカツヤカミキリ	1000		成虫発生期 但し、収穫前日まで								
	ナモグリバエ	1000～2000		収穫前日まで								
	うどんこ病											
キャベツ	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ アザミウマ類	1000		収穫14日前まで								
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンハムシ ナメクジ類											
	アブラムシ類											
はくさい			1000～2000									

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルフェンピラド を含む農薬の 総使用回数
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ						
	ヒメフタテンヨコバイ ナメクジ類	1000					
非結球レタス	ア布拉ムシ類 ナモグリバエ	2000			1回		1回
セルリー	ア布拉ムシ類 ナモグリバエ			収穫30日前まで	2回以内		2回以内
カリフラワー	コナガ	1000		収穫3日前 まで			
いちご	アブラムシ類 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ チャノホコリダニ うどんこ病 クロバネキノコバエ類	1000		1番花の 開花まで	1回		1回
	アザミウマ類 うどんこ病			収穫前日 まで	2回以内		2回以内
すいか	アブラムシ類	1000～2000					
	アザミウマ類 うどんこ病						
アスパラガス	ネギアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ ツマグロアオカスマキカメ	1000	100～800ℓ/10a				
しょくようほおづき	コナジラミ類	2000	100～800ℓ/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500	200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回		1回
	マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ						
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類	1000	100～300ℓ/10a	発生初期	4回以内		
チューリップ	アブラムシ類				3回以内		4回以内
	チューリップサビダニ	500	—	掘取後 ～植付前	1回	15分間 球根浸漬	

## 上手な使い方

- アブラムシ類、アザミウマ類、ニセナシサビダニ、ミカンサビダニ及びチャノホコリダニは密度の増加が速いので、発生初期に散布すると効果的です。
- 浸透性がない薬剤ですので、散布ムラのないように散布してください。
- アブラムシ類に対して、即効的に効果を発現しますが、虫が作物体上にしがみついて残る場合があります。数日後に効果確認を行なってください。
- サビダニ類に対して成虫および幼虫だけでなく、優れた殺卵効果があります。
- シンクイムシ類、モモハモグリガに対して殺卵作用がありますが、浸透移行性はないので発生が少ない時期に十分な散布液量で散布してください。
- お茶に使用する場合には、コテツフロアブルとの混用はさけ、近接散布する場合は少なくとも10日以上あけてください。
- しそ科植物（しそ、サルビア等）にかかると薬害を生じるおそれがあるので注意してください。

## 使用上の注意



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- ダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布ムラのないようていねいに散布してください。
- クビアカツヤカミキリの防除に使用する場合、成虫に直接かかるように散布してください。
- レタス・非結球レタス、はくさい及びセルリーの幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- ばらには薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 周辺作物（きゅうり、だいこん、かぶ、にがうりの幼苗期及びこまつな、チンゲンサイなどの軟弱野菜）にかかると薬害を生じるおそれがあるので、からないよう十分注意して散布してください。
- カラー、花はすぐに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかかるないようにしてください。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに対して影響があるので注意してください。
- 天敵昆虫に対して影響があるので注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 散布液調製時には保護眼鏡を着用してください。
- 散布の際は保護眼鏡、保護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。  
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

## 貯蔵上の注意



直射日光をさけ、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。盗難、紛失の際には、警察に届け出でください。