


プリグロックスLのイネ科雑草種子発芽後枯殺効果

- プリグロックスLがイネ科雑草植物体上の種子に付着した場合、成熟した種子がこぼれ落ちて新たな発生源にならずに除草効果の安定につながります。

種子発芽後枯殺効果

※プリグロックスLの有効成分は土壤に接触後、すみやかに吸着され、不活性化されます。土壤処理効果はありません。



プリグロックスL処理区では、雑草の生育はみとめられません。

■スズメノカタビラ



無処理



プリグロックスL 50倍



プリグロックスL 100倍



プリグロックスL 200倍

■ネズミムギ



無処理



プリグロックスL 50倍



プリグロックスL 100倍



プリグロックスL 200倍

■エノコログサ



無処理



プリグロックスL 50倍



プリグロックスL 100倍



プリグロックスL 200倍

■メヒシバ



無処理



プリグロックスL 50倍



プリグロックスL 100倍



プリグロックスL 200倍

種子発芽後枯殺効果 2015年 シンジェンタジャパン(株)中央研究所 所定濃度の希釈液に雑草種子を3秒間浸漬。浸漬後直ちに種子を紙上に移して風乾。乾燥後、湿る紙を敷いたシャーレに種子を置床して温度25℃・湿度60%の条件下にて管理した。撮影日:スズメノカタビラ(処理10日後)、ネズミムギ(処理6日後)、エノコログサ・メヒシバ(処理7日後)

 **プリグロックス®L**



安全な登録農薬を使いましょう！安全使用推進運動展開中
きちんと。ただし。農薬は必ずカギをかけて保管しましょう。ラベルをよく読んで正しく使いましょう。

適用作物及び適用場所・雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	ハラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)				
移植水稲	―	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800～1000	600～1000	1回	1回	1回	
直播水稲			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日～は種後7日(イネ出芽前)						
麦類			は種前又はは種後出芽前						
さとうきび			雑草生育期						
	園場内の周縁部	多年生雑草	但し、収穫3日前まで	1000～2000	3回以内	3回以内	3回以内		
未成熟とうもろこし	―	一年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600～1000	100～150	5回以内	5回以内	5回以内	
とうもろこし(子実)			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで(草丈30cm以下)						
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)			は種前又は種付前			2回以内	2回以内	2回以内	
			時間処理: 雑草生育期 (草丈30cm以下)但し、収穫3日前まで						
だいず			は種後又は種付前			4回以内	4回以内	4回以内	4回以内
			は種後出芽前 雑草生育期 (草丈20cm以下)						
いも類 (ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く)			時間処理: 雑草生育期 (草丈30cm以下)但し、収穫3日前まで			3回以内	3回以内	3回以内	3回以内
			種付前						
えだまめ			時間処理: 雑草生育期 (草丈30cm以下)但し、収穫14日前まで			4回以内	4回以内	4回以内	4回以内
			萌芽直前						
ばれいしょ	200～300(北海道)	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内				
	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで								
かんしょ やまのいも	種付前	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内				
	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで								
さといも	種付前	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内				
	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで								
こんにやく	種付前	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内				
	種付後から萌芽直前								
果樹類 (かんきつを除く)	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで	5回以内	5回以内	5回以内	5回以内				
	多年生雑草								
かんきつ	スギナ	5回以内	5回以内	5回以内	5回以内				
	一年生雑草								
いちご	多年生雑草	5回以内	5回以内	5回以内	5回以内				
	スギナ、ソコサ								
野菜類 (レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(莖葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)	は種前又は種付前	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内				
	定植前又は時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで								
	は種前又は種付前								

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数					
				薬量 (mℓ/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)									
キャベツ カリフラワー たいこん ごぼう	－	一年生雑草	畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫30日前まで	600～1000	100～150	3回以内		3回以内	3回以内					
トマト きゅうり ほうれんそう ピーマン かぼちゃ			は種前又は種付前											
はくさい ブロッコリー レタス たまねぎ ねぎ にんじん なす すいか メロン しょうが にんにく			畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫14日前まで											
			は種前又は種付前											
			アスパラガス							畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫3日前まで				
										は種前又は種付前				
萌芽前： 雑草生育期 (草丈20cm以下)														
スギナ			畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫前日まで							1000～2000	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内	2回以内
ふき			萌芽前											
			畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫21日前まで											
みょうが (花穂)		萌芽前												
		畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫30日前まで												
みょうが (莖葉)		萌芽前												
		畦間処理： 雑草生育期 但し、みょうが(花穂) の収穫30日前まで、 花穂を収穫しない 場合にあっては 開花期終了まで												
うど		畦間処理： 雑草生育期(根株養成 期)但し、収穫75日前まで												
		は種前又は種付前												
パセリ やまのいも (むかご)		畦間処理： 雑草生育期 但し、収穫7日前まで												
		一年生及び 多年生雑草	萌芽前： 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで	1000～2000		3回以内		3回以内	3回以内					
茶		一年生雑草	摘採7日前まで											
桑			春期萌芽前 又は伐採後											
たばこ	大土寄期畦間 処理・雑草生育期													
チューリップ	種付後萌芽前 (雑草生育期)													
花き類・観葉植物 (チューリップ、 すいせんを除く)	一年生雑草	畦間処理： 雑草生育期 (草丈20cm以下)	600～1000	3回以内		3回以内 (ウイルス 罹病株の 枯殺は 1回以内)	3回以内 (ウイルス 罹病株の 枯殺は 1回以内)							
すいせん		畦間処理： 雑草生育期 (草丈20cm以下)												
樹木類		萌芽前(雑草生育期)												
		雑草生育期 (草丈30cm以下)												
水田作物 畑作物 (休耕田)	水田畦畔	雑草生育期	800～1000	4回以内	4回以内	4回以内	4回以内							
水田作物 (水田畦畔)			600～1000											
樹木等	多年生雑草	雑草生育期	1000～2000	5回以内	5回以内	5回以内	5回以内							
			1500～2000											
	一年生雑草	雑草生育期	800～1000	3回以内	植栽地を 除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉 散布	3回以内	3回以内							
			スギナ					スギナ生育期	1000～2000					

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジクワットを 含む農薬の 総使用回数	パラコートを 含む農薬の 総使用回数
チューリップ	ウイルス 罹病株の 枯殺	1mL/株	第2葉展開期 から開花 20日後まで	1回/ 罹病株	ウイルス 罹病株葉への 滴下	3回以内 (ウイルス罹病株の 枯殺は1回以内)	3回以内 (ウイルス罹病株の 枯殺は1回以内)

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●使用後の空容器・空袋等は園場などに放置せず適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。



最新情報はこちら

OAT アグリオ株式会社
https://www.oat-agrio.co.jp/
〒101-0052東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00～12:00・13:00～17:00)
土日祝日を除く