



水稻用除草剤 登録番号 第 20156 号

ユートピア1キロ粒剤

(シクロスルファムロン・ペントキサゾン粒剤)

有効成分	シクロスルファムロン 0.60% ペントキサゾン 4.5%
性 状	類白色細粒
毒 性	普通物
有効年限	5 年
包 装 (1ケース)	1kg×10袋／ケース 4kg×4袋／ケース
化管法	ペントキサゾン（1種）4.5%

特長

1. 田植同時処理で作業を省略
2. 50～60日効果が持続
3. 高い土壌吸着で安定効果
4. 有効成分は2種類

適用内容

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植 水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ （北海道を除く） ヘラオモダカ （北海道） クログワイ （北海道、北陸を除く）	移植時	砂壤土～埴土	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用	北海道
			壤土～埴土				東北 北陸
			砂壤土～埴土				関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯
			壤土～埴土				近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯
	オモダカ ヒルムシロ （北陸を除く） アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土～埴土			湛水散布	北海道
			壤土～埴土				東北 北陸
			砂壤土～埴土				関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯
			壤土～埴土				近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯
		移植後3日～ノビエ1.5葉期 ただし、移植後30日まで	砂壤土				

シクロスルフアムロンを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

使用上の注意

1. 雑草の発生前からノビエの1.5葉期まで有効なので、時期を失ないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、クログワイ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期です。
2. クログワイ、オモダカの防除に当たっては、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。
3. 苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきは丁寧に行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。また、未熟有機物を施用した場合は特に丁寧に行ってください。
4. 田植え同時期に施用する場合は、通常の移植作業と同様に落水下で田植えと施用を行い、施用後に入水してください。また、入水後の散布については、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布してください。処理後は通常の湛水状態（水深3～5 cm程度）を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、7日間は落水、かけ流しはしないでください。
5. 散布直後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。
6. 苗が水没するような深水状態では、葉鞘部に軽い褐変症状が出るおそれがあるので、水管理に注意してください。
7. 以下のような条件下では、薬害を生ずるおそれがあるので使用をさけてください。特にこれらの水田条件と散布日または散布数日以内の梅雨明けなどによる異常高温が重なると、初期生育の抑制が顕著になるので注意してください。
 - ・砂質土壌の水田や漏水の大きな水田（減水深2cm／日以上）。
 - ・軟弱徒長苗を移植した水田。
 - ・極端な浅植えをした水田や浮き苗の多い水田および極端な深植えをした水田。
8. れんこん、くわい、いぐさ、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
9. いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
10. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は異常気象時は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
11. 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
12. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
13. 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
14. 散布後は水管理に注意してください。
15. 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

貯蔵上の注意

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。

Copyright © 2021 OAT Agrio Co., Ltd. All rights reserved.