



殺虫剤 登録番号 第 20533 号

ラグビーMC粒剤

(カズサホスマイクロカプセル剤)

有効成分	カズサホス 3.0%
性 状	淡灰色細粒
毒 性	普通物
有効年限	3 年
包 装 (1ケース)	5kg×4袋 10kg×1袋
化管法	カズサホス (1種) 3.0%

特長

1. センチュウ類に高い効果を示します。
2. 土壌害虫にも効果を示します。
3. マイクロカプセル製剤ですので長い期間高い効果が持続します。
4. 粒剤なので、処理・取扱いが簡単です。
5. ガス抜き作業の必要はありません。

適用害虫と使用方法

a

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カズホサスを含む農薬の総使用回数
だいこん	キスジノミハムシ	20～30 kg/10a	は種前	1回	全面 処理 土壌 混和	1回
	ネコブセンチュウ	20kg/10a				
	ネグサレセンチュウ	10～30 kg/10a				
きゅうり	ネコブセンチュウ	20～30 kg/10a	定植前			
すいか						
メロン						
トマト						
ミニトマト						
なす						
にんにく	イモグサレセンチュウ	30kg/10a				
さといも	ネグサレセンチュウ	20～30 kg/10a				
	コガネムシ類	20kg/10a				

かんしょ	ネコブセンチュウ	10～30 kg/10a	植付前		
	ハリガネムシ類	20～30 kg/10a			
	コガネムシ類	9kg/10a			作条 処理 土壌 混和
キャベツ	ネグサレセンチュウ	20kg/10a	定植前		全面 処理 土壌 混和
ほうれん そう	ネコブセンチュウ		は種前		
いちご	ネグサレセンチュウ		定植前		
ねぎ	ネコブセンチュウ				
	ネダニ類				
ばれいし よ	ジャガイモシスト センチュウ	20kg/10a	植付前		2回以内（仮植圃では1回以 内、本圃では1回以内）
えだまめ	ダイズシストセン チュウ		は種又は 定植前		
だいず			は種前		
しそ	ネコブセンチュウ		定植前		
しそ（花 穂）			仮植前		
バジル			定植前		
みずな			は種前		

ピーマン			定植前			1回
ししとう			植付前			
しょうが						
ごぼう	ネグサレセンチ ユウ		は種前		播溝 処理 土壌 混和	
葉ごぼう						
きく					全面 処理 土壌 混和	
トルコギ キョウ	ネコブセンチュ ウ	30kg/10a	植付前			

上手な使い方

- ムラなく均一に散布

定植（播種）前に土壌全面に均一に散布してください。
- 十分に混和

薬剤が土壌中にいきわたるよう、20cm程度の深さまで、ムラなく十分混和してください。
- 土壌水分に注意

手で土壌を握って、崩れない程度の土壌水分が最適です。

使用上の注意



1. 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
2. 播種前、定植前または植付前に圃場全体に均一に散布し、10～20cmの深さに土壌と十分混和してください
3. 散布が不均一であったり、混和が不十分な場合には薬効不足や初期生育の遅延、生育不良等の薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
4. 一時に広範囲に使用する場合は、散布器具は飛散が少なく、均一に散布できる乗用トラクター装着粒剤施用機を用いてください。
5. 桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。
6. ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
7. ハウス栽培で使用し、ミツバチまたはマルハナバチを導入する場合、散布直後には活動に影響を及ぼすおそれがあるので、処理後30日以上たってから導入してください。
8. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
9. 有機りん剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びP A M製剤があります。本剤では硫酸アトロピン製剤を使用してください。
10. かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
11. 水産動物（魚類、甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
12. 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また空袋等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

貯蔵上の注意

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。