OATアグリオ株式会社

「オリオン水和剤40」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、 厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オリオン水和剤40」が平成28年6月22日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オリオン水和剤40(第18504号)

有効成分・%: アラニカルブ・・・・・・・・・・・・・・・・ 40.0%

登録年月日 : 平成28年6月22日(登録拡大)

〈1〉適用内容の変更:

(1) 作物名「かんきつ」に適用病害虫「ミカンバエ成虫」を追加する。

(2) 作物名「りんご」の適用病害虫「ケムシ類」の希釈倍数を「1000~1500倍」に変更する。

【変更後の適用表】

作物名	適 用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	アブラスシリリカイガラシ類 カイガラシ類 ケッカー ケッキュ カーカー アザミス カーカー カーカー カーカー アグラ キャッカー カーカー アゲエダ ター・カー アイ	1000倍 1000~ 1500倍	200~700 L/10a	収穫 14 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
りんご	アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ハマキムシ類 カイガラムシ類 ケムシ類			収穫前日まで	2回以内		2 回以内
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類	1000倍		収穫3日前まで			
£ &	アブラムシ類 シンクイムシ類			収穫7日前まで	5回以内		5 回以内
ネクタリン	モモハモグリガ カイガラムシ類			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
ぶどう	チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫45日前まで			
かき	アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類			収穫21日前まで	3 回以内		3 回以內
小粒核果類 (うめを除 く)	アブラムシ類 ケムシ類			収穫7日前まで			

(つづき)

<u>('')'')''</u>							
作物名	適 用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 ノコメトガリキリガ	1000倍 1000~ 1500倍 750倍	200~700 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	- 散布	3回以内
びわ	アブラムシ類				5回以内		5 回以内
ばれいしょ	ワタアブラムシ		100∼300 L/10a	収穫前日まで	5 回以内		
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ						5 回以内
メロン	アブラムシ類 ウリノメイガ						
すいか	アブラムシ類 オオタバコガ						
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
てんさい	ヨトウムシ テンサイトビハムシ			収穫14日前まで	3回以内		2 回 17 内
茶	チャノコカクモンハマキ		200~400 L/10a	摘採14日前まで			3回以内
きく	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	1000倍	100∼300 L/10a	発生初期	5 回以内		5 回以内
さくら	アメリカシロヒトリ		200~700 L/10a				O EL SET

<2>注意事項等の変更なし