

平成 28 年 10 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が平成 28 年 10 月 19 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第 2 0 8 1 8 号)

有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 平成 28 年 10 月 19 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

適用害虫の追加

- ・ かぶ (アブラムシ類、2000倍)
- ・ ばれいしょ (ナストビハムシ、2000 倍)
- ・ ねぎ (アブラムシ類、1000 倍)
- ・ にんにく (チューリップサビダニ、1000 倍)

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェン [®] ラト [®] を含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
はくさい	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類	1000～2000 倍					
	レタス			アブラムシ類 ナモグリバエ ナメクジ類 べと病			
非結球レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	1000～2000 倍					
	ナメクジ類 べと病	1000 倍					
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ ナモグリバエ カブラハバチ	1000～2000 倍					
	白さび病 ワッカ症	1000 倍					
かぶ	キスジノミハムシ コナガ	1000～2000 倍					
	ハイマダラノメイガ ナモグリバエ アブラムシ類	2000 倍					
	カブラハバチ 白さび病	1000 倍					
きゅうり	ウリノメイガ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1000～2000 倍					
	うどんこ病 べと病 褐斑病	1000 倍					
にがうり	アザミウマ類						
すいか	アブラムシ類 アザミウマ類	1000～2000 倍					
	コナジラミ類 うどんこ病	1000 倍					
なす	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 マメハモグリバエ	1000～2000 倍					
	チャノホコリダニ	1000～4000 倍					
	チビクロネキノコバエ うどんこ病	1000 倍					
				収穫前日まで		株元散布 散布	

つづき

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラトを含む農薬の総使用回数
トマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ	1000～2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	ハモグリバエ類 うどんこ病	1000 倍					
ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ	2000 倍		収穫3日前 まで			
ばれいしょ	アブラムシ類 ナストビハムシ						
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ シロイチモジヨトウ アブラムシ類 さび病 べと病	1000 倍		収穫前日 まで			
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 コナガ	1000～2000 倍					
ピーマン	アザミウマ類	1000 倍		収穫前日 まで			
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病						
にんにく	ネギコガ アザミウマ類 アブラムシ類 チューリップサビダニ			収穫7日前 まで			
にら	ネギアザミウマ	収穫14日前 まで					
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ	1000～1500 倍	200～400 L/10a	摘採14日 前まで	1回		1回
	チャトゲコナジラミ マダラカサハラハムシ ツマグロアオカスミカメ						
きく	アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000 倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
	白さび病			発病初期			

<2>注意事項等の変更

なし