

平成 28 年 11 月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「トモノールS」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「トモノールS」が平成 28 年 11 月 2 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : トモノールS (第9783号)

有効成分・% : マシン油 ..... 97.0%

登録年月日 : 平成 28 年 11 月 2 日 (登録拡大)

<1>適用内容の変更 :

希釈倍数・使用時期の追加

- ・ 「おうとう」のカイガラムシ類 希釈倍数「100倍」・使用時期「発芽後2週間まで」

希釈倍数の追加

- ・ うめ (カイガラムシ類) 希釈倍数「25~50倍」に変更

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マシン油を含む農薬の総使用回数				
かんきつ	カイガラムシ類 ハダニ類	60～80 倍	200～ 700L/10a	12～3 月	—	散布	—				
	ハダニ類	100～200 倍		4～5 月							
	ヤノネカイガラムシ幼虫 ハダニ類			夏期							
りんご	ハダニ類	25 倍		発芽前							
		50 倍		芽出直前直後							
		100 倍		展葉期（発芽後 2 週間まで）							
		200 倍		展葉期（発芽後 3 週間まで）							
なし	カイガラムシ類 ハダニ類	25～50 倍		200～ 700L/10a				発芽前	—	散布	—
	カイガラムシ類										
もも ネクタリン	ハダニ類及び越冬卵	50 倍						発芽後 2 週間まで			
かき	25～50 倍										
おうとう	カイガラムシ類	100 倍						発芽前			
		25～50 倍									
うめ	20～50 倍	50 倍	8～9 月								
すもも	30 倍										
小粒核果類 (うめ、すももを 除く)	100 倍	100 倍	—								
キウイフルーツ	50 倍										
びわ	200 倍	100 倍	—								
きゅうり	100～150 倍										
いちご すいか なす	クワシロカイガラムシ	50～100 倍	1000L/10a		5～9 月	—	散布	—			
茶	クワシロカイガラムシ	100～150 倍	200～ 400L/10a	10～3 月							
	チャトゲコナジラミ	50～100 倍		5～9 月							
	カンザワハダニ	100～150 倍	10～3 月								
	チャノナガサビダニ	50～150 倍	5～9 月								
桑	クワシロカイガラムシ	30 倍	50～ 200L/10a	12～3 月							
	クワシロカイガラムシ 若齢幼虫	50～60 倍	5～11 月								

適用農薬名	作物名	使用方法
ベノミル剤	なし	本剤でベノミル剤を 20 倍に希釈し、塗布する

〈2〉注意事項等の変更

なし