OATアグリオ株式会社

「ベリマークSC」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、 厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ベリマークSC」が平成29年9月27日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ベリマークSC (第23556号)

有効成分・%: シアントラニリプロール・・・・・・・・・・・・・・ 18.7%

登録年月日 : 平成29年9月27日(登録拡大)

<1>適用内容の変更:

・ 「トマト」、「ミニトマト」、「きゅうり」、「ピーマン」、「なす」、「メロン」及び 「すいか」の「希釈倍数」及び「使用液量」の表記を「薬量」及び「希釈水量」に変更。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

	/旭川44】						
作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジアントラニリプ ロール を含む農薬の 総使用回数
キャヘ゛ツ	ハスモンヨトウ アサ゛ミウマ類 アブ゛ラムシシ類 コナカ゛ アオムシ ヨトウムシ ハイマダ゛ラノメイカ゛ ネキリムシ類 ウワハ゛類類 アブ゛ラムシ゛						4 回以内 (定植時までの
はくさい	コナカ゛ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダ゛ラノメイカ゛ カフ゛ラハハ゛チ		tル成型育苗トレイ 1 箱またはペー パーポット 1 冊	育苗期後半			処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)
ブ゛ロッコリー	コナカ゛ アオムシ ハスモンヨトウ アフ゛ラムシ類 アサ゛ミウマ類	400 倍	(約 30×60cm、 使用土壌 約 1.5〜4L) 当り 0.5L	~定植当日	1 回	灌注	
レタス	オオタハ゛コカ゛ ハモク゛リハ゛エ類 ハスモンヨトウ						
非結球レタス	アフ゛ラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ						1 🖂
カリフラワー	アオムシ コナカ゛ ハスモンヨトウ						1 回
ねぎ	シロイチモシ゛ョトウ アサ゛ミウマ類						4回以内 (定植時までの 処理は1回以
	ハモク゛リハ゛ェ類	2000 倍	$0.5L/m^2$	収穫7日前まで		株元 灌注	内、定植後の処 理は3回以内)

作物名	適用病害虫名	使月	用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニリプロール を含む農薬の
		薬量	希釈水量				総使用回数
ミニトマト	アブ・ラムシ類 アサ゛ミウマ類 コナシ゛ラミ類 ハモク゛リハ゛エ類	400 株当り 25mL	400 株当り 10~20L (1 株当り 25~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1 回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以
きゅうりょ。	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						内、定植後の散 布は3回以内)
なす	コナジ・ラミ類		400 株当り 10L (1 株当り 25mL)				1 回
	アフ゛ラムシ類 アサ゛ミウマ類 ハモク゛リハ゛ェ類 ネキリムシ類		400 株当り 10~20L (1 株当り 25~50mL)				
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						