

平成 29 年 10 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「テルスター水和剤」登録内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「テルスター水和剤」が平成 29 年 10 月 25 日付けにて変更登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : テルスター水和剤 (第 2 0 7 9 1 号)  
有効成分・% : ビフェントリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.0%

登録年月日 : 平成 29 年 10 月 25 日

<1>適用内容の変更 :

- ・ りんごの本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更。
- ・ ぶどうの本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更。
- ・ りんごのビフェントリンを含む農薬の総使用回数を「2 回以内」から「1 回」へ変更。
- ・ ぶどうのビフェントリンを含む農薬の総使用回数を「2 回以内(くん煙剤は1 回以内)」から「2 回以内(散布は1 回以内、くん煙は1 回以内)」へ変更。

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフェントリンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類	1000～2000倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内		
	アブラムシ類 ワタミヒゲナガゾウムシ	1000倍							
りんご	モモシンクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ハマキムシ類 アブラムシ類 リンゴハダニ ナミハダニ	1000倍			2回以内		1回	1回	
	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ アブラムシ類 ハダニ類								1000～2000倍
なし	モモハモグリガ アブラムシ類 カメムシ類	1000倍			1回		1回	2回以内 (散布は1回以内、くん煙は1回以内)	
もも	チャノキイロアザミウマ								
ぶどう	カメムシ類 チャノキイロアザミウマ	1000～2000倍			2回以内		収穫前日まで	2回以内	
かき	カキクダアザミウマ ハダニ類 カキノヒメヨコバイ	1000倍							
びわ	アブラムシ類 オオタバコガ カメムシ類	1000～2000倍			100～300 L/10a		収穫3日前 まで	4回以内	4回以内
あけび (果実)	アブラムシ類	1000倍							
ハスカップ			収穫21日前 まで						
ばれいしょ	アズキノメイガ	1500倍	150～300 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	2回以内			
あずき	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1000倍					3回以内	3回以内	
きゅうり	アブラムシ類 ハダニ類		1000倍	4回以内	4回以内				
すいか	アブラムシ類 ハダニ類 タバココナジラミ類 (シルバーリーフコ ナジラミを含む)	1000倍				4回以内	4回以内		
メロン	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類		1000倍	3回以内	3回以内				
なす									

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ビフェントリンを含む農薬の総使用回数		
キャベツ はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	1000~1500倍	150~300 L/10a	収穫 21 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内		
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍		収穫 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内		
だいこん	アブラムシ類	1000~1500倍		収穫 21 日前 まで					
てんさい	ヨトウムシ	250倍	25L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内			4 回以内	
	カメノコハムシ	1000~1500倍							
	ハダニ類	1500倍							
だいず	アブラムシ類	1000~1500倍	100~300 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内			2 回以内	2 回以内
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ								
パセリ	アブラムシ類								
茶	チャノココクモンハ マキ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨ コバイ チャノキイロアザミ ウマ カンザワハダニ ヨモギエダシャク	1000倍	200~400 L/10a	摘採 14 日前 まで	2 回以内				2 回以内
	ホップ					アズキノメイガ ハダニ類			
たばこ	ヨトウムシ アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1500倍	25~180 L/10a	収穫 10 日前 まで	3 回以内				3 回以内
芝	スジキリヨトウ シバツトガ		300 mL/m <sup>2</sup>	発生初期					
ばら	ハダニ類	1000倍	150~300 L/10a	-	3 回以内				3 回以内
きく									
カーネーション									
樹木類	ケムシ類		200~700 L/10a	発生初期	6 回以内				6 回以内