

平成 30 年 10 月 吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「プリグロックスL」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました除草剤「プリグロックスL」が平成 30 年 10 月 10 日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : プリグロックスL (第16397号)  
有効成分・% : ジクワット ..... 7.0%  
                  パラコート ..... 5.0%

登録年月日 : 平成 30 年 10 月 10 日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「はとむぎ」(一年生雑草)を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
移植水稻	—		秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800~1000 mL/10a		1回		1回	2回以内
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000 mL/10a					
麦類	圃場内の周縁部		は種前又はは種後出芽前 雑草生育期			4回以内		4回以内	4回以内
はとむぎ	—	一年生雑草	畦間処理：雑草生育期（出穂前まで）但し、収穫60日前まで					2回以内	
ばれいしょ			萌芽直前	400~600 mL/10a 200~300 mL/10a (北海道)	100~150 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内 (茎葉枯凋は1回以内)	2回以内
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く)	—		植付前						
かんしょ やまのいも			畦間処理：雑草生育期但し、収穫30日前まで 植付前	600~1000 mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
さといも			畦間処理：雑草生育期但し、収穫前日まで 植付前						
こんにやく			植付後から萌芽直前 畦間処理：雑草生育期但し、収穫30日前まで						

(続き)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	雑草生育期 但し、 収穫前日まで	800～1000 mL/10a	100～150 L/10a	5回以内		5回以内	5回以内	
		多年生雑草		1500～ 2000 mL/10a						
		スギナ		1000～ 2000 mL/10a						
かんきつ		一年生雑草		800～1000 mL/10a						
		多年生雑草		1500～ 2000 mL/10a						
		スギナ ツユクサ		1000～ 2000 mL/10a						
野菜類(レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)	-	一年生雑草	は種前又は植付前	600～1000 mL/10a	100～150 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内	
キャベツ カリフラワー だいこん ごぼう										畦間処理：雑草生育期但し、収穫30日前まで
トマト きゅうり ほうれんそう ピーマン かぼちゃ										は種前又は植付前
いちご										畦間処理：雑草生育期但し、収穫14日前まで
										は種前又は植付前 定植前又は畦間処理：雑草生育期但し、収穫前日まで

(続き)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
アスパラガス	—	一年生雑草	は種前又は植付前	600～1000 mL/10a	100～150 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
			畦間処理：雑草生育期但し、収穫前日まで						
はくさい ブロッコリー レタス たまねぎ ねぎ にんじん なす すいか メロン しょうが にんにく	—	一年生雑草	は種前又は植付前	600～1000 mL/10a	100～150 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
			畦間処理：雑草生育期但し、収穫3日前まで						
茶	—	一年生雑草	摘採7日前まで	800～1000 mL/10a	100～150 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
ふき	—	一年生雑草	萌芽前 畦間処理：雑草生育期但し、収穫21日前まで	600～1000 mL/10a					
みょうが (花穂)	—	一年生雑草	萌芽前 畦間処理：雑草生育期但し、収穫30日前まで		600～1000 mL/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
みょうが (茎葉)	—	一年生雑草	萌芽前 畦間処理：雑草生育期但し、みょうが(花穂)の収穫30日前まで、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで						
たけのこ	—	一年生及び多年生雑草	萌芽前：雑草生育期(草丈30cm以下)但し、収穫7日前まで	1000～2000 mL/10a	100～150 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内

(続き)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
うど	—	一年生雑草	畦間処理：雑草生育期（根株養成期） 但し、収穫75日前まで	600～1000 mL/10a	100～150 L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
やまのいも (むかご) パセリ			は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期但し、 収穫7日前まで			3回以内		3回以内	3回以内
豆類（種実、ただし、 だいず、らっかせいを除く）			は種前又は植付前 畦間処理：雑草生育期（草丈 30cm以下） 但し、収穫3日前まで			2回以内		2回以内	2回以内
だいず			は種前又は植付前 は種後出芽前 雑草生育期（草丈20cm以下） 畦間処理：雑草生育期（草丈 30cm以下） 但し、収穫3日前まで			4回以内		4回以内	4回以内
えだまめ			畦間処理：雑草生育期（草丈 30cm以下） 但し、収穫14日前まで						
さとうきび			圃場内の周縁部			多年生雑草		雑草生育期但し、 収穫3日前まで	1000～ 2000 mL/10a
未成熟 とうもろこし	—	一年生雑草	畦間処理：雑草生育期但し、 収穫3日前まで（草丈30cm以下）	600～1000 mL/10a		5回以内		5回以内	5回以内
とうもろこし (子実)			畦間処理：雑草生育期但し、 収穫45日前まで（草丈30cm以下）						
桑			春期萌芽前又は伐採後			800～1000 mL/10a		3回以内	3回以内

(続き)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
たばこ	—	一年生雑草	大土寄期畦間処理：雑草生育期	800～1000 mL/10a	100～150 L/10a	1回	雑草茎葉散布	1回	1回	
花き類・観葉植物 (チューリップ、すいせんを除く)			畦間処理：雑草生育期 (草丈 20cm 以下)	600～1000 mL/10a		3回以内			3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は 1回以内)	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は 1回以内)
すいせん			萌芽前： (雑草生育期)							
チューリップ			植付後萌芽前 (雑草生育期)							
樹木類			畦間処理：雑草生育期 (草丈 20cm 以下)							
			雑草生育期 (草丈 30cm 以下)							
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田		800～1000 mL/10a	100～150 L/10a	4回以内		雑草茎葉散布			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	多年生雑草	600～1000 mL/10a		5回以内	5回以内		5回以内		
			1000～2000 mL/10a							
樹木等	公園庭園 提とう 駐車場 道路 宅地 のり面 等	一年生雑草	1500～2000 mL/10a	100～150 L/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内		
			800～1000 mL/10a							
	スギナ	スギナ生育期	1000～2000 mL/10a							

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株の枯殺	1 mL/株	第 2 葉展開期から開花 20 日後まで	1回/罹病株	ウイルス罹病株葉への滴下	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は 1回以内)	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は 1回以内)