

これにて一掃落着!



さまざまな作物のうどんこ病に!



フルチアニル乳剤

®

ガッテン乳剤

うどんこ病用殺菌剤

®はOATアグリオ(株)の登録商標

総合版



OATアグリオ株式会社

フルチアニル乳剤[®] ガッテン乳剤

うどんこ病用殺菌剤

有効成分	フルチアニル・・・5.0%
人畜への安全性	普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
性状	黄色澄明可乳化油状液体
有効年限	4年
包装	100ml×20本(ケース) 40ml×10本×4箱(ケース)


特長

- デュアルカットオフ効果[®]で、既存剤に対して感受性が低下したうどんこ病に対しても高い効果を示します。
- 残効性に優れることから、1シーズン中のうどんこ病防除回数の低減が期待できます。
- 病斑拡大抑制作用、分生子形成阻害作用及び分生子遊離阻害作用で、2次感染(病気の拡大)を遮断します。
- 果実に対する汚れの心配が少なく、収穫前日まで使用可能です。
- 有用生物や天敵に対する影響が少なく、IPM体系に有用な資材として使用できます。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルチアニルを含む農薬の総使用回数
きゅうり なす すいか メロン かぼちゃ ズッキーニ いちご	うどんこ病	5000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
花き類・ 観葉植物				発病前～ 発病初期			
樹木類			200～700 ℓ/10a				

効果発現(作用特性)



安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布液調整時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣等を着用するとともに、保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに、衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管上の注意

- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には注意してください。
- 火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- いちごに使用する場合、品種によっては果実に薬害を生じる可能性があるので注意してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 空容器は園場などに放置せず、適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

※この資料は平成28年10月現在の知見に基づき作成したものです。

取扱い

OAT アグリオ株式会社
<http://www.oat-agrio.co.jp/>
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1
 コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日をのぞく)