



殺菌剤 登録番号 第 20358 号

オーシャイン水和剤

(オキシポコナゾールフマル酸塩水和剤)

有効成分	オキシポコナゾールフマル酸塩 20%
性 状	類白色水和性粉末 40μm以下
毒 性	普通物
有効年限	5 年
包 装 (1ケース)	100g×40袋 335g×20袋 500g×20袋

特長

1. 広いスペクトラムを持ち、各種果樹作物病害の同時防除が可能です。
2. 従来のDMI剤では難防除とされた各種病害にも有効です。またDMI剤としては初めて灰色かび病にも卓効を示します。
3. 予防・治療の両効果があり、広い散布適期幅を有します。
4. 有用昆虫、天敵に対して安全性の高い殺菌剤です。

適用病害と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用方 法	オキシポコナ ゾール フマル酸塩を 含む農薬の 総使用回数						
りんご	黒星病 赤星病	3000 ～ 4000	200 ～ 700ℓ/10a	収穫7日前 まで	5回以 内	散布	5回以内						
	モニリア病	2000 ～ 4000											
	うどんこ病 斑点落葉病 黒点病	2000 ～ 3000											
	すす点病 すす斑病	3000											
おうとう	灰星病	3000 ～ 4000											
	幼果菌核病 褐色せん孔病	3000											
なし	黒星病 赤星病	3000 ～ 4000											
	黒斑病	2000											
	うどんこ病	3000											
小粒核果類※ (うめを除く)	灰色かび病 黒星病 灰星病												

うめ	灰色かび病 灰星病		収穫前日ま で	3回以 内	3回以内
	黒星病 すす斑症	2000 ～ 3000			
もも	灰星病 黒星病				
	ホモプシス腐 敗病	1000 ～ 2000			
ネクタリン	灰星病 黒星病	2000 ～ 3000			
	ホモプシス腐 敗病	2000			
ぶどう	芽枯病	1000	収穫30日前 まで	2回以 内	2回以内
	うどんこ病 黒とう病	2000 ～ 3000	収穫7日前 まで		
	灰色かび病	2000		5回以 内	5回以内
かんきつ （みかんを除 く）	そうか病 灰色かび病 貯蔵病害 （ 緑かび 病） 貯蔵病害 （ 青かび 病）				
みかん					

※小粒核果類に該当する作物：うめ、すもも（プルーン、プラム含む）、あんず

上手な使い方

1. なし（赤梨系）に使用する場合、樹勢の弱い時などに高濃度で散布すると葉に薬害を生じる可能性があるため、使用濃度を厳守してください。
2. ぶどうに使用する場合、萌芽直後～新葉展開初期に高濃度で散布すると葉に薬害を生じる可能性があるため使用濃度を厳守してください。

使用上の注意

1. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
2. ぶどうに使用する場合、次の事項に注意してください。
 - ①果実肥大期(だいず粒大)以降の散布で、散布後の薬剤の乾きが遅い場合、ノースレッド、ハニーシードレス、ハニービーナス及び巨峰の果実表面にさび果を生じるおそれがあるので、園地管理の徹底及び使用濃度を厳守してください。
 - ②無袋栽培で使用する場合は、果房に汚れが生じるので、果実肥大期中期以降の散布は注意してください。
3. りんごのうどんこ病には、効果がやや劣る場合があるので、多発生が予想される場合には、うどんこ病に効果の高い他剤との輪番使用をこころがけてください
4. 周辺の作物にかかると薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分に注意して散布してください。
5. 使用に当たっては、所定の希釈倍数を厳守し、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
6. 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。
7. 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
8. 誤飲、誤食などのないように注意してください
9. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。

貯蔵上の注意

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。