

令和3年10月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

## 「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が令和3年10月19日付にて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第20818号)

有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%

登録年月日 : 令和3年10月19日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名の追加 : やまのいも / アブラムシ類、ナガイモコガ、葉渋病
- ・ 作物名の追加 : たまねぎ / アザミウマ類
- ・ 作物名の追加 : らっきょう / アザミウマ類

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布 散布	2回以内
	ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ、アブラムシ類	1000～2000倍					
はくさい	ナメクジ類	1000倍					
	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍					
レタス	ナメクジ類、べと病	1000倍		収穫30日前まで	1回		1回
	アオムシ、コナガ アブラムシ類、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、カブラハバチ、ダイコンサルハムシ、白さび病	2000倍					
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、アブラムシ類	2000倍		収穫7日前まで	1回		1回
きゅうり	ウリノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	1000～2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
	うどんこ病、べと病、褐斑病	1000倍					
にがうり たまねぎ らっきょう	アザミウマ類	1000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
すいか	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000倍					
	コナジラミ類、うどんこ病	1000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	2000倍					
やまのいも	アブラムシ類、ナガイモコガ、葉渋病	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギハモグリバエ、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、さび病、べと病	1000倍					
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	1回	1回	
ピーマン	アザミウマ類	1000倍					
	チャノホコリダニ、コナジラミ類、うどんこ病	1000倍		収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
にんにく	ネギコガ、チューリップサビダニ、アザミウマ類、アブラムシ類、さび病	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	1回	1回	
にら	ネギアザミウマ	1000倍					

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト <sup>®</sup> を含む農薬の総使用回数
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
	チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、ツマグロアオカスミカメ						
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類	1000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
	白さび病			発病初期			
しきみ	アザミウマ類		100～700 L/10a	発生初期			