

令和3年12月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が令和3年12月8日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第20818号)
有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%
登録年月日 : 令和3年12月8日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 適用病害虫名の追加 : ねぎ／クロバネキノコバエ類
- ・ 適用病害虫名の変更 : だいこんのダイコンサルハムシをダイコンハムシに変更

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト [®] を含む農薬の総使用回数			
キャベツ	アザミウマ類	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内			
	ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ、アブラムシ類	1000～2000 倍								
はくさい	ナメクジ類	1000 倍								
	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000 倍								
レタス	ナメクジ類、べと病	1000 倍								
	アオムシ、コナガ アブラムシ類、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、カブラハバチ、ダイコンハムシ、白さび病	2000 倍								
だいこん	キスジノミハムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、アブラムシ類			収穫 30 日前まで	1 回		1 回			
かぶ	ウリノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	1000～2000 倍		100 ～ 300 L/10a	収穫 7 日前まで		2 回以内	2 回以内		
きゅうり	うどんこ病、べと病、褐斑病	1000 倍		1000～2000 倍	収穫前日まで					
	にがうり たまねぎ らっきょう	アザミウマ類								
すいか	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000 倍	1000 倍	収穫 7 日前まで						
	コナジラミ類、うどんこ病	1000 倍								
ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	2000 倍	1000 倍			収穫 7 日前まで				
やまのいも	アブラムシ類、ナガイモコガ、葉渋病									
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギハモグリバエ、クロバネキノコバエ類、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、さび病、べと病	1000 倍	1000 倍						収穫 7 日前まで	
	ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ								
ピーマン	アザミウマ類	1000～2000 倍	100 ～ 300 L/10a							収穫前日まで
	チャノホコリダニ、コナジラミ類、うどんこ病	1000 倍								
にんにく	ネギコガ、チューリップサビダニ、アザミウマ類、アブラムシ類、さび病	1000 倍	100 ～ 300 L/10a		収穫 7 日前まで		2 回以内	2 回以内		
にら	ネギアザミウマ	1000 倍			収穫 14 日前まで		1 回	1 回		

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト [®] を含む農薬の総使用回数
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回
	チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、ツマグロアオカスミカメ						
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類	1000倍	100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
	白さび病			発病初期			
しきみ	アザミウマ類		100～700 L/10a	発生初期			