

令和3年12月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が令和3年12月8日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第21056号)
有効成分・% : トルフェンピラド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15.0%
登録年月日 : 令和3年12月8日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「なし」及び「なし(苗木)」に適用病害虫名「チュウゴクナシキジラミ」を追加する。
- ・ 作物名「かんきつ」に適用病害虫名「ナメクジ類」を追加する。
- ・ 作物名「はくさい」の適用病害虫名「ダイコンサルハムシ」を「ダイコンハムシ」に変更する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後の適用表】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数 |
|-----------------|--|------------|---------------|----------------|----------|------|---------------------|
| なし | アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、クワコナカイガラムシ、チュウゴクナシキジラミ | 2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫 30 日前まで | 1 回 | 散布 | 1 回 |
| なし(苗木) | アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、チュウゴクナシキジラミ | | 100～700 L/10a | 育苗期 | | | |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 2000～3000倍 | 200～700 L/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | | |
| | アブラムシ類、チャノホコリダニ、カネタタキ | 2000倍 | | | | | |
| | アザミウマ類 | 1000～2000倍 | | | | | |
| | ゴマダラカミキリ、コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、ヨモギエダシヤク、ヨコバイ類、ミカンバエ成虫、ナメクジ類 | 1000倍 | | | | | |
| すもも | アブラムシ類 | 2000倍 | | 収穫14日前まで | | | |
| もも ネクタリン | シンクイムシ類 | 1000～2000倍 | | 収穫前日まで | | | |
| | アブラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ | 2000倍 | | 成虫発生期但し、収穫前日まで | | | |
| | アザミウマ類 | 1000倍 | | | | | |
| | クビアカツヤカミキリ | | | | | | |
| さやえんどう 実えんどう | ナモグリバエ | 1000～2000倍 | | 収穫前日まで | | | |
| | うどんこ病 | | | | | | |
| キャベツ | コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類 | 1000倍 | | | | | |
| はくさい | コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ、ナメクジ類 | | | 100～300 L/10a | 収穫14日前まで | | |
| | アブラムシ類 | 1000～2000倍 | | | | | |
| レタス | アブラムシ類、ナモグリバエ | 1000倍 | | | | | |
| | ヒメフタテンヨコバイ、ナメクジ類 | 1000倍 | | | | | |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数 |
|-----------|---|------------|------------------|----------|------------|------|---------------------|
| 非結球レタス | アブラムシ類、ナモグリバエ | 2000倍 | 100～300 L/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| セルリー | | | | 収穫30日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| カリフラワー | コナガ | 収穫3日前まで | | | | | |
| いちご | アブラムシ類、アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、クロバネキノコバエ類、うどんこ病 | 1000倍 | | 1番花の開花まで | 1回 | | 1回 |
| | | すいか | | アブラムシ類 | 1000～2000倍 | | 収穫前日まで |
| | アザミウマ類、うどんこ病 | 1000倍 | | | | | |
| アスパラガス | ネギアザミウマ、アブラムシ類、コナジラミ類、ジュウシホシクビナガハムシ、ツマグロアオカスミカメ | | 100～800 L/10a | | | | |
| しょくようほおずき | コナジラミ類 | 2000倍 | 100～300 L/10a | 摘採14日前まで | 1回 | 1回 | |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ | 1000～1500倍 | 200～400 L/10a | | | | |
| | マダラカサハラハムシ、チャトゲコナジラミ | 1000倍 | 100～300 L/10a | | | | 発生初期 |
| 花き類・観葉植物 | アザミウマ類 | 3回以内 | | 4回以内 | | | |
| チューリップ | アブラムシ類 | 1000～2000倍 | 300L/10a | | 掘取後～植付前 | 1回 | 15分間球根浸漬 |
| | チューリップサビダニ | 500倍 | — | | | | |