

長期持続型水稲用除草剤

ネビロス®-ラジカル ジャンボ

軽くて、速くて、長く効く。
これが水田除草のNEWスタンダード。



散布の負担を大きく軽減！

独自開発のラジカル製剤で1パックの重さが20gと軽く、10パック投げ入れるだけです。



パッと広がるターボ拡散！

水面で浮いたまま拡散をし、拡散終了までの時間も短く、拡散不良による効果不足や薬害の心配が少なくなりました。



50～60日の長い効き目！

土壌表層に処理層を形成することで、50～60日の長期にわたり安定した効果を発揮します。




ネビロス®-ラジカル ジャンボ



登録番号: 第20937号
有効成分: カフェンストロール…………… 15.0%
シクロスルフアロン …… 3.0%
ダイムロン …………… 30.0%

■水面でパッとひろがるターボ拡散

ラジカル製剤は、水面で浮いたまま拡散を始めます。また、拡散終了までの時間も短く、拡散不良による効果不足や葉害の心配が少なくなりました。



■使用適期(上手な使い方)



■使用量:
20g/パックを10個/10a
水深5~6cmの湛水条件で投入。

適用雑草と使用方法

※地域や圃場条件によって、差異がでることがあります。

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量	総使用回数※	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ(北海道、九州) クログワイ (北海道及び北陸を除く) オモダカ ヒルムシロ セリ(北海道) アオミドロ・藻類による 表層はく離(北陸を除く)	移植後3日~ ノビエ2葉期 ただし、 移植後30日まで	砂壤土~ 埴土	小包装(パック) 10個(200g)	本剤のみ 1回 カフェンストロール剤 1回 シクロスルフアロン剤 2回以内 ダイムロン剤 3回以内 (育苗箱散布は1回以内、 本田では2回以内)	水田に 小包装(パック) のまま投げ入れる	全域の普通期 および 早期栽培地帯

※印は収穫物の残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

▲使用上の注意事項

- 必要量を購入し、出来るだけ残すことなく使いきってください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業しないでください。
- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ2葉期までに時期を失しないように散布してください。
- 雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にブレがでますので、必ず適期に散布してください。
各雑草の散布適期は以下のとおりです。
ホタルイ、ミズガヤツリ…………… 2葉期まで
ウリカワ…………… 2葉期まで(東北、北陸、関東・東山・東海、九州は、発生始期まで)
ヘラオモダカ…………… 発生始期まで(九州は、発生前まで)
ヒルムシロ…………… 発生期まで
セリ…………… 再生前から始期
クログワイ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離…………… 発生前
- クログワイ、オモダカの防除に当たっては、必要に応じて有効な剤と組み合わせ使用してください。
- 苗の植付けが均一になるように代かきをていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合には特に代かきをていねいに行ってください。
- 10アール当たり10個の割合で水田に小包装のまま投下してください。
- 散布に当たっては、水の出入りを止めて水深5~6cmの湛水条件で投下し、散布後少なくとも3~4日間は、通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないよう注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 藻類や表層はく離等の多発している水田では、拡散が不十分となり効果が劣る可能性があるので使用をさけてください。
- 散布直後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるので使用をさけてください。

- 下記のような条件では葉害が発生するおそれがあるので、使用をさけてください。
①砂質土壌の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)
②軟弱な苗を移植した水田
③極端な浅植の水田および浮き苗の多い水田
- 散布後数日間暑い高温が続く場合、初期生育が抑制されることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育に対する影響は認められません。
- 本剤はその殺草特性からいぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 水溶性フィルムに小包装化されているため、濡れた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破袋した場合には以下の点に注意してください。
①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
②皮ふに対して刺激性があるので、皮ふに付着しないよう注意してください。皮ふに付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
③かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。
吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管してください。

このチラシの記載内容は2021年12月現在のものです。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記録しましょう。