

令和4年11月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「カリグリーン」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「カリグリーン」が令和4年11月9日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : カリグリーン (第18358号)
有効成分・% : 炭酸水素カリウム 80.0%

登録年月日 : 令和4年11月9日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「りんご」を「果樹類 (ブルーベリーを除く)」に変更する。
- ・ 作物名「ブルーベリー」に適用病害虫名「うどんこ病」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	炭酸水素カリウムを含む農薬の総使用回数				
麦類		500 倍	60～150 L/10a	収穫前日 まで	—	散布	—				
果樹類（ブルーベリーを除く）	うどんこ病	800 倍	200～700 L/10a								
ブルーベリー	うどんこ病 灰色かび病										
野菜類 （トマト、ミニトマトを除く）	うどんこ病	800～1000 倍	100～300 L/10a								
	さび病 灰色かび病	800 倍									
トマト ミニトマト	うどんこ病	800～1000 倍									
	さび病 灰色かび病 葉かび病	800 倍									
ホップ	うどんこ病 灰色かび病		200～500 L/10a								
たばこ		800～1000 倍	100～180 L/10a					収穫 3 日前 まで	2 回以内		2 回以内
花き類・ 観葉植物 （きくを除く）	うどんこ病	800 倍	150～500 L/10a					発病初期	—		—
きく	うどんこ病 白さび病										