

令和4年8月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「オリオン水和剤40」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「オリオン水和剤40」が令和4年8月24日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オリオン水和剤40 (第18504号)
有効成分・% : アラニカルブ 40.0%

登録年月日 : 令和4年8月24日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「びわ」に適用害虫名「ビワキジラミ」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 アゲハ類 ヨモギエダシャク カネタタキ ミカンバエ成虫 クワノミハムシ	1000 倍	200～700 L/10a	収穫 14 日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	りんご			アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ オオタバコガ ハマキムシ類 カイガラムシ類			
	ケムシ類	1000～ 1500 倍		収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類	1000 倍		成虫発生期 但し、収穫 14 日 前まで			
もも	クビアカツヤカミキリ			収穫 14 日前まで			
ネクタリン	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類			収穫 21 日前まで			
	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期 但し、収穫 21 日 前まで			
ぶどう	チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類	収穫 45 日前まで		1 回	1 回		
かき	アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類	収穫 21 日前まで					

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アラニカルブ を含む農薬の 総使用回数	
小粒核果類 (うめを除く)	アブラムシ類 ケムシ類	1000 倍	200~700 L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	クビアカツヤカミキ リ			成虫発生期 但し、収穫7日 前まで				
うめ	アブラムシ類 ケムシ類 ノコメトガリキリガ			収穫7日前まで	3回以内			3回以内
	クビアカツヤカミキ リ			成虫発生期 但し、収穫7日 前まで				
びわ	アブラムシ類 ピワキジラミ		収穫7日前まで	5回以内	5回以内			
ばれいしょ	ワタアブラムシ		100~300 L/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内	
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ							
メロン	アブラムシ類 ウリノメイガ			収穫7日前まで	4回以内			4回以内
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類			収穫14日前まで	3回以内			3回以内
てんさい	ヨトウムシ テンサイトビハムシ		1000~ 1500 倍	200~400 L/10a	摘採14日前まで			
茶	チャノコカクモンハマキ	750倍	100~300 L/10a	発生初期	5回以内	5回以内		
きく	アブラムシ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ	200~700 L/10a	成虫発生期					
さくら	ケムシ類	1000 倍	200~700 L/10a	成虫発生期	5回以内	5回以内		
	クビアカツヤカミキ リ							