

令和4年11月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が令和4年11月9日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第20818号)
有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 令和4年11月9日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- ・ 適用病害虫名の追加: だいこん/ワッカ症 (2000倍)
- ・ 適用病害虫名の追加: たまねぎ/べと病 (1000倍)

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト [®] を含む農薬の総使用回数	
キャベツ	アザミウマ類	1000倍	100 ~ 300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ、アブラムシ類	1000~2000倍						
はくさい	ナメクジ類	1000倍						
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000~2000倍						
	ナメクジ類、べと病	1000倍						
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、カブラハバチ、ダイコンハムシ、白さび病、ワッカ症	2000倍		収穫30日前まで	1回		1回	
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、アブラムシ類			収穫7日前まで				
きゅうり	ウリノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	1000~2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内	
	うどんこ病、べと病、褐斑病							
にがうり らっきょう	アザミウマ類	1000倍						
たまねぎ	アザミウマ類、べと病							
すいか	アブラムシ類、アザミウマ類	1000~2000倍						
	コナジラミ類、うどんこ病	1000倍						
ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	2000倍						
やまのいも	アブラムシ類、ナガイモコガ、葉渋病							
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギハモグリバエ、クロバネキノコバエ類、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、さび病、べと病	1000倍	収穫7日前まで					
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ	1000~2000倍						
ピーマン	アザミウマ類		収穫前日まで			1回		1回
	チャノホコリダニ、コナジラミ類、うどんこ病	1000倍						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト [®] を含む農薬の総使用回数
にんにく	ネギコガ、チューリップサビダニ、アザミウマ類、アブラムシ類、さび病	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
にら	ネギアザミウマ			収穫 14 日前まで			
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500 倍	200 ～ 400 L/10a	摘採 14 日前まで	1 回		1 回
	チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、ツマグロアオカスミカメ						
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	発生初期	4 回以内	4 回以内	
	白さび病			発病初期			
しきみ	アザミウマ類		100 ～ 700 L/10a	発生初期			